



### Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof acetylcysteïne zijn **geneesmiddelen die slijmen verdunnen**.

Gebruik acetylcysteïne bij

- **slijmhoest** (hoest waarbij je slijm (fluïmen) ophoest);
- **COPD**, een aandoening van de longen waarbij een langdurige ontsteking (bronchitis) leidt tot een vernauwing van de luchtwegen.



### Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die acetylcysteïne bevatten. Je ziet er hoeveel acetylcysteïne ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen die naast acetylcysteïne nog andere werkzame stoffen bevatten. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een [nieuwe zoekopdracht](#) uit.



### Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

#### Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

- **Vaste vorm (volwassenen)**: je mag **niet meer innemen dan 400 à 600 mg (milligram) per dag** (24 uur), te verdelen over 1 tot 3 innames.
- **Vloeibare vorm (volwassenen)**: je mag **niet meer innemen dan 15 ml (milliliter) per dag** (24 uur), te verdelen over 1 tot 3 innames.

De dosering voor kinderen, vind je terug in [Acetylcysteïne voor kinderen](#).

#### Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem acetylcysteïne in op **gelijk welk moment** van de dag, **met of zonder voedsel**.

Als je acetylcysteïne verschillende keren per dag neemt, zorg er dan voor dat **dedosissen** gelijkmatig over de dag worden **verdeeld**.

#### Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Gebruik acetylcysteïne **zo kort mogelijk**. Als de **klachten** van hoesten **verdwenen** of **niet meer hinderlijk** zijn, **stop** dan met het gebruik van acetylcysteïne.

Heb je ondanks het gebruik van acetylcysteïne na 14 dagen nog evenveel of zelfs meer last van klachten? Neem dan **contact op met je arts**.



## Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van acetylcysteïne zijn de volgende:

### Soms (tot 1 op 100 mensen)

- hoofdpijn;
- oorsuizen;
- hoge hartslag;
- toename van slijm in de longen;
- loopneus;
- braken, diarree, buikpijn, misselijkheid;
- ontsteking van de mond;
- jeuk;
- koorts;
- lage bloeddruk.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



## Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Ja, je kan in één keer stoppen met het gebruik van acetylcysteïne. **Als je symptomen niet meer hinderlijk zijn**, doe je dit best zo snel mogelijk.



## Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

### Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis acetylcysteïne op het **volgende voorziene tijdstip**.

Neem **nooit een dubbele dosis** acetylcysteïne om een vergeten dosis in te halen.

### Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Je kan volgende klachten krijgen: misselijkheid, braken en diarree.



## Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

### Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je acetylcysteïne gebruikt.

### Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken als je acetylcysteïne gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van alcohol op acetylcysteïne.

### Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je acetylcysteïne gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op acetylcysteïne.



### Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Acetylcysteïne is veilig voor zwangere vrouwen.

Acetylcysteïne wordt afgeraden voor vrouwen die borstvoeding geven.

#### Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Ja, je mag acetylcysteïne gebruiken tijdens de zwangerschap. Er zijn **geen negatieve effecten bekend**.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van acetylcysteïne met je **arts of je apotheker**.

#### Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van acetylcysteïne wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding** omdat niet bekend is of acetylcysteïne wordt uitgescheiden in de moedermelk.

**Bespreek dit met je arts of apotheker** als je borstvoeding geeft en acetylcysteïne wil gebruiken.



### Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Acetylcysteïne kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen.

Er zijn voor acetylcysteïne **geen mogelijk ernstige wisselwerkingen** bekend. De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



### Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik acetylcysteïne niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij een **maag- of darmzweer**.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van acetylcysteïne, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



### Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?



Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?

Neem contact op met je arts of apotheker.