

Acetylsalicylzuur als antistolling

Werkzame stof

Belangrijk om te weten

- Je loopt een **hoger risico** om een **bloeding** te krijgen door het gebruik van acetylsalicylzuur.

Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof acetylsalicylzuur in een lage dosering zijn **geneesmiddelen die het vormen van bloedklonters tegengaan**. Door het gebruik van acetylsalicylzuur heb je **minder kans op een bloedklonter**.

Gebruik acetylsalicylzuur in een lage dosis om bepaalde **aandoeningen van het hart en de bloedvaten te behandelen of te voorkomen**. Bijvoorbeeld:

- bij een hartaanval;
- na een beroerte;
- bij pijn op de borst door een vernauwde slagader;
- bij sommige heelkundige ingrepen aan de slagaders van het hart;
- bij pijn door vernauwingen in de bloedvaten van de benen (etalagebenen).

Je kan acetylsalicylzuur ook in een hogere dosering gebruiken bij pijn, koorts en ontsteking. Zie hiervoor [Acetylsalicylzuur bij pijn, ontsteking en koorts](#).

Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](#).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die enkel acetylsalicylzuur in lage dosering bevatten. Je ziet er hoeveel acetylsalicylzuur ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen die naast acetylsalicylzuur nog andere werkzame stoffen bevatten. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een [nieuwe zoekopdracht](#) uit.

Er zijn ook geneesmiddelen met acetylsalicylzuur die voor een andere aandoening worden gebruikt. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een [nieuwe zoekopdracht](#) uit.

Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Staat de informatie niet op het etiket, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Voor een bloedverdünnend effect, mag je **niet meer innemen dan 100 mg (milligram) per dag** (24 uur), tenzij je arts dit anders voorschrijft. Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem acetylsalicylzuur in op gelijk welk moment van de dag. Je kies het best een **vast tijdstip** zodat je je dagelijkse dosis niet vergeet.

Neem acetylsalicylzuur in **met of zonder voedsel**

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Het is mogelijk dat je acetylsalicylzuur voor een lange tijd of zelfs levenslang moet gebruiken. De arts kan je behandeling echter aanpassen als dat nodig is, en dat kan betekenen dat je andere geneesmiddelen krijgt.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden:

- oorsuizen;
- snellere en diepere ademhaling;
- klachten die wijzen op een allergische reactie zoals zwelling van het gezicht en de lippen of netelroos (urticaria);
- ongewone bloedingen.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van acetylsalicylzuur zijn de volgende:

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- verhoogde neiging tot bloedingen zoals na het trekken van een tand of tijdens de menstruatie (maandstonden);
- misselijkheid, buikpijn, braken, diarree;

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- maagzweer;
- darmzweer;
- verborgen bloedverlies zoals in de darmen (let op voor bloed in de stoelgang);
- netelroos (urticaria);
- loopneus;
- moeilijker kunnen ademen, zeker bij patiënten met astma.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).

Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

In de meeste gevallen zal je acetylsalicylzuur **levenslang** moeten innemen. Zet de behandeling niet stop zonder **advies van je arts**.

Indien je, in samenspraak met je arts, zou stoppen met het gebruik van acetylsalicylzuur, dan kan je **in één keer stoppen**.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis acetylsalicylzuur op het **volgende voorziene tijdstip**.

Neem **nooit een dubbele dosis** acetylsalicylzuur om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Je kan volgende klachten krijgen:

- je voelt je duizelig;
- je hebt hoofdpijn;
- oorsuizingen;
- gehoorverlies.

Bij een ernstige overdosering krijg je ergere, algemene klachten.

Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je acetylsalicylzuur gebruikt.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je drinkt best geen alcohol als je acetylsalicylzuur gebruikt.

Alcohol versterkt het irriterend effect van acetylsalicylzuur, wat ervoor kan zorgen dat je last krijgt van je maag of je darmen.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je acetylsalicylzuur gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op acetylsalicylzuur.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Acetylsalicylzuur wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Het gebruik van acetylsalicylzuur in een lage dosis wordt **afgeraden tijdens de zwangerschap**.

Bij langdurig gebruik van **hoge dosissen** acetylsalicylzuur (meer dan 500mg per dag) heb je een hoger risico op een **miskraam**, **afwijkingen** bij de baby, en een **verlengde zwangerschap** en **arbeid**. Daarom wordt ook het gebruik van **lage dosissen** **afgeraden**.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van acetylsalicylzuur met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Langdurig gebruik van **hoge dosissen** acetylsalicylzuur wordt **afgeraden** tijdens de borstvoeding. Acetylsalicylzuur in een lage dosis (tot 160 mg per dag) is waarschijnlijk veilig.

De baby kan **ongewenste effecten** ondervinden van het gebruikte acetylsalicylzuur waardoor hoge dosissen acetylsalicylzuur afgeraden worden.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en acetylsalicylzuur wil gebruiken.

Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Acetylsalicylzuur kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- sommige **ontstekingsremmers**;
- sommige geneesmiddelen bij **depressie en stemmingsstoornissen**;
- **methotrexaat**, een geneesmiddel bij kanker, psoriasis of reuma;
- **vaccin tegen windpokken**;

- **acetazolamide**, een geneesmiddel bij een te hoge oogdruk en de preventie van hoogteziekte;
- andere geneesmiddelen die het **vormen van bloedklonters tegengaan** (bloedverdunners);

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik acetylsalicylzuur niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij een (voorgeschiedenis van) **maagbloeding of darmbloeding**;
- bij een (voorgeschiedenis van) **maagzweer of darmzweer**;
- als je een **bloedstollingsstoornis** hebt;
- kinderen **jonger dan 12 jaar** met een (vermoeden van) **virale infectie**, zoals de griep of waterpokken;
- bij een **mindere werking van de nieren** (nierinsufficiëntie);
- bij een **mindere werking van de lever** (leverinsufficiëntie);
- als je een **operatie** of een **ingreep aan de tanden** moet ondergaan.
- als je een **genetisch tekort** van het enzym glucose-6-fosfaat-dehydrogenase hebt.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van acetylsalicylzuur, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem contact op met je arts of apotheker.