



### Belangrijk om te weten

- Neem avanafil in ongeveer **15 tot 30 minuten voordat** je van plan bent **seks** te hebben.
- Je mag maar **éénmaal per dag** avanafil innemen.
- Drink best **geen alcohol** als je avanafil gebruikt.



Geneesmiddelen die gebruikt worden bij erectiestoornissen, worden heel vaak nagemaakt. Deze producten kan je dan kopen in een illegaal circuit, zoals via illegale websites. **Door geneesmiddelen te kopen buiten het legale circuit, neem je een gezondheidsrisico.** Lees deze [pagina](#) als je hierover meer informatie wenst.



### Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof avanafil zijn geneesmiddelen die de **bloedvaten in de penis ontspannen**. Daardoor kan er **meer bloed stromen in de penis tijdens seksuele opwinding**.

Je arts schrijft avanafil voor bij **erectiestoornissen** (= impotentie). Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor en tijdens seks.



### Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die avanafil bevatten. Je ziet er hoeveel avanafil ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.



### Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

#### Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Avanafil wordt voorgeschreven aan **volwassenen mannen**.

Je mag **niet meer innemen dan 200 mg (milligram) per dag** (24 uur), tenzij je arts dit anders voorschrijft. Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

## Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem avanafil in ongeveer **15 tot 30 minuten voordat** je van plan bent **seks** te hebben. Het zal je alleen helpen een erectie te krijgen wanneer je op dat moment ook zin hebt in seks.

**Je mag maar éénmaal per dag avanafil innemen.**

Neem avanafil in **met of zonder voedsel**. Indien je het inneemt tijdens of net na de maaltijd, kan het langer duren alvorens je een effect merkt.

## Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Je mag avanafil enkel indien nodig innemen, ongeveer 15 tot 30 minuten vóór je seks hebt.

**Je mag maar éénmaal per dag avanafil innemen.**



## Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

**Neem contact op met je arts als je na inname van avanafil, een erectie hebt die langer dan 4 uur aanhoudt.**

Neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn de symptomen van een allergische reactie:

- piepende ademhaling;
- ademhalingsmoeilijkheden;
- duizeligheid;
- zwelling van je oogleden, gezicht, lippen of keel.

Neem contact op met je arts als je pijn op je borst krijgt tijdens of na de seksuele activiteit.

Neem contact op met je arts als je een plotse vermindering of verlies hebt van je zicht.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van avanafil zijn de volgende:

### Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- hoofdpijn;
- (heel veel) blozen;
- verstopte neus.

### Soms (tot 1 op 100 mensen)

- hartkloppingen;
- opvliegers (plots warmtegevoel);
- wazig zicht;
- duizeligheid;
- hoofdpijn door een verstopping van je sinussen;
- misselijkheid en braken;
- maag- en darmproblemen;
- pijn of stijfheid in je spieren;
- rugpijn;
- slaperigheid.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de

bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



### Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Ja, je kan in één keer stoppen met het gebruik van avanafil.

Gebruik avanafil **enkel indien nodig**: als je van plan bent om seks te hebben.



### Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

#### Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem avanafil in ongeveer 15 tot 30 minuten voor je seks hebt. Wanneer je dit vergeten bent, neem dan je dosis in en wacht tot het effect optreedt.

#### Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245).

Je kan volgende klachten krijgen:

- misselijkheid;
- hoge bloeddruk;
- snelle hartslag;
- hartritmestoornissen.



### Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

#### Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je een voertuig besturen of machines bedienen als je avanafil gebruikt, **behalve** als je:

- je **duizelig** voelt;
- je **slaperig** voelt;
- een **wazig of dubbel zicht** hebt of minder goed ziet.

Enkel wanneer je deze klachten niet hebt, mag je een voertuig besturen of machines bedienen, maar **blijf altijd voorzichtig**.

#### Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

**Nee**, je drinkt beter geen alcohol voordat je avanafil gebruikt.

**Alcohol verzwakt de effecten van avanafil**, wat ervoor kan zorgen dat je **minder gemakkelijk een erectie** krijgt.

#### Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

**Nee**, je mag niet alles eten als je avanafil gebruikt.

Je mag **geen pompelmoes of ander aanverwant citrusfruit** (zoals pomelo) eten. Ook **bereidingen op basis van deze vruchten** moet je vermijden.

Indien je het inneemt tijdens of net na de maaltijd, kan het langer duren alvorens je een effect merkt.



## Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef? Heeft dit geneesmiddel een invloed op mijn vruchtbaarheid?

Avanafil wordt enkel voorgeschreven aan mannen.

Er zijn geen gegevens over het gebruik van avanafil tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

### Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Avanafil wordt enkel voorgeschreven aan mannen.

Er zijn geen gegevens over het gebruik van avanafil tijdens de zwangerschap.

### Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Avanafil wordt enkel voorgeschreven aan mannen.

Er zijn geen gegevens over het gebruik van avanafil tijdens de borstvoeding.

### Heeft dit geneesmiddel een invloed op mijn vruchtbaarheid?

Er is **geen gekend effect** op de vruchtbaarheid bij mannen die avanafil gebruiken.



## Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Avanafil kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- sommige geneesmiddelen bij een **mindere werking van het hart** (hartfalen);
- sommige geneesmiddelen bij **pijn op de borst door een vernauwde slagader**;
- sommige geneesmiddelen bij een **hoge bloeddruk**;
- sommige geneesmiddelen bij een **vergroting van de prostaat**;
- **riociguat**, een geneesmiddel gebruikt bij een hoge bloeddruk in de longen;
- bepaalde geneesmiddelen kunnen de manier waarop avanafil door de lever wordt **afgebroken beïnvloeden**. Dit kan de **werkzaamheid veranderen** of het risico op **bijwerkingen verhogen**. Onder deze geneesmiddelen vallen onder andere:
  - sommige geneesmiddelen bij epilepsie;
  - sommige antibiotica;
  - sommige geneesmiddelen bij schimmelinfecties;
  - sommige geneesmiddelen bij kanker;
  - sommige geneesmiddelen bij hiv;
  - sommige geneesmiddelen bij taailsijmziekte;
  - sint-janskruid, een kruid bij depressie.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: [‘Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?’](#). Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



## Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik avanafil niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij een **mindere werking van de lever** (leverinsufficiëntie);
- bij een **mindere werking van de nieren** (nierinsufficiëntie);
- bij een **zeer lage bloeddruk** (hypotensie);
- als je **ernstige hartproblemen** hebt;
- als je ooit **verlies had van je zicht vanwege een afsluiting van de bloedvaatjes die de oogzenuw van bloed voorzien**;
- als je een **afwijking** hebt van je **rode bloedcellen** zoals bij sikkelcelanemie, leukemie of beenmergkanker.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van avanafil, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



## Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

### Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

### Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

