



Belangrijk om te weten

- Je kan je **vermoeid en duizelig** voelen door bisoprolol.
- Door het gebruik van bisoprolol kan je een **licht gevoel in het hoofd** krijgen.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof bisoprolol zijn geneesmiddelen die de hartslag vertragen en het hart beter doen pompen.

Je arts schrijft bisoprolol voor bij:

- een te hoge bloeddruk;
- pijn op de borst door een vernauwde slagader (hartkramp);
- een snelle of onregelmatige hartslag;
- een mindere werking van het hart (hartfalen).



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die enkel bisoprolol bevatten. Je ziet er hoeveel bisoprolol ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen die naast bisoprolol nog andere werkzame stoffen bevatten. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een [nieuwe zoekopdracht](#) uit.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Je mag **niet meer innemen dan 10 mg (milligram) per dag** (24 uur). Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Je arts zal beslissen op welk tijdstip je bisoprolol moet innemen, kijk hiervoor op het **etiket van de apotheker**.

Neem bisoprolol in **met of zonder voedsel** en kies een **vast tijdstip**.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Het is mogelijk dat je bisoprolol voor een lange tijd of zelfs levenslang moet gebruiken. De arts kan je behandeling echter aanpassen als dat nodig is, en dat kan betekenen dat je andere geneesmiddelen krijgt.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Wanneer de volgende bijwerkingen optreden, stop de behandeling en neem contact op met je arts:

- trage hartslag (trager dan 60 slagen per minuut);
- onregelmatige hartslag.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van bisoprolol zijn:

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- vermoeidheid;
- duizeligheid en hoofdpijn (vooral in het begin van de behandeling, dit is meestal mild en verdwijnt binnen 1-2 weken);
- koude of gevoelloze vingers, tenen, oren of neus;
- licht gevoel in je hoofd bij het rechtstaan (orthostatische hypotensie).

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- slaapproblemen;
- depressie;
- trage of onregelmatige hartslag, verergeren van hartfalen;
- krampachtige pijn in de benen tijdens het lopen;
- moeilijkere ademhaling bij patiënten met astma of met een voorgeschiedenis van ademhalingsproblemen.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Nee, je mag een behandeling met bisoprolol niet zomaar zonder medisch advies stoppen.

Als je te vroeg stopt, kan je bloeddruk weer verhogen en zal je hart weer meer nood hebben aan zuurstof. Dit kan leiden tot de terugkeer van klachten van pijn op de borst.

Het is **noodzakelijk** om na een behandeling met bisoprolol de dosis **traag te verminderen**. Bekijk samen met je **arts of apotheker** hoe je dit het best aanpakt. Zij kunnen je helpen om een schema op te stellen.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis bisoprolol op het **volgende voorziene tijdstip**.

Neem **nooit een dubbele dosis** bisoprolol om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker** of bel het Antigifcentrum (070 245 245).

Je kan volgende klachten krijgen:

- duizeligheid;
- vermoeidheid;
- korte en piepende ademhaling;
- trage hartslag;
- lage bloeddruk;
- mindere werking van je hart;
- minder goed inspanningen kunnen leveren;
- pijn op de borst;
- te lage bloedsuikerspiegel;
- sufheid.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen tijdens het gebruik van bisoprolol, **behalve** als je:

- je **duizelig** voelt;
- je **vermoeid** voelt.

Deze klachten kan je vooral hebben bij het **begin van de behandeling**, wanneer de **dosering** wordt **aangepast** of wanneer je **alcohol** drinkt.

Enkel wanneer je deze **klachten niet hebt**, mag je een **voertuig besturen of machines bedienen**, maar **blijf altijd voorzichtig**.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken tijdens het gebruik van bisoprolol, **behalve** als je je duizelig voelt door het gebruik van bisoprolol. **Alcohol versterkt** namelijk die duizeligheid.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je bisoprolol gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op bisoprolol.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Bisoprolol wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Over het gebruik van bisoprolol tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te zijn dat het veilig is. Je arts zal de ernst van je symptomen afwegen tegen het risico voor je kind.

Als je hoge bloeddruk hebt, is het belangrijk om tijdens je zwangerschap een behandeling te volgen. Dat is nodig om je bloeddruk normaal te houden, wat goed is voor je eigen gezondheid en die van je baby.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Besprek** dan het gebruik van bisoprolol met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van bisoprolol wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding**. Het is niet bekend of bisoprolol wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Besprek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en bisoprolol moet gebruiken.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Bisoprolol kan een invloed hebben op of beïnvloed worden door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- sommige **ontstekingsremmers**;
- **adrenaline** (bij de behandeling van een levensbedreigende allergische reactie): de werking van adrenaline zal verminderd zijn;
- sommige geneesmiddelen tegen suikerziekte (diabetes mellitus);
- andere geneesmiddelen bij een **hoge bloeddruk**;
- sommige geneesmiddelen bij een **onregelmatige hartslag**;
- sommige geneesmiddelen bij **astma**.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik bisoprolol niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij **astma, piepende ademhaling of een andere longziekte**;
- bij een **trage of onregelmatige hartslag**;
- bij een **lage bloeddruk**;
- bij een aandoening waarbij **vingers of tenen tijdelijk wit of blauw worden door een slechte doorbloeding** (fenomeen van Raynaud).

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van bisoprolol, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?

Neem contact op met je arts of apotheker.