

Symbicort Forte Turbohaler 320 µg - 9 µg

Geneesmiddel

FarmaInfo

een initiatief van het fagg²

Prijs

€ 33,03

Terugbetaald

Ja

Remgeld

€ 8,43

Remgeld verhoogde terugbetaling

€ 5,01

Firma

AstraZeneca SA-NV

Aflevering

Medisch voorschrift

Verpakking

Multidoseringscontainer

De werkzame stoffen van Symbicort Forte Turbohaler 320 µg - 9 µg zijn **Budesonide en Formoterol**. Hier vind je alle informatie over de werking van Budesonide en Formoterol.



Belangrijk om te weten

- Volg **altijd de instructies** van je apotheker voor het **correct inhaleren** van budesonide + formoterol. Een goede inhalatietechniek zorgt voor een **betere werking** van het geneesmiddel.
- Budesonide + formoterol is een **onderhoudsbehandeling**: je moet dit geneesmiddel elke dag gebruiken, niet enkel bij een aanval.
- Als je **meer of vaker** budesonide + formoterol moet gebruiken dan normaal, **contacteer dan je arts**. Je behandeling moet dan misschien worden aangepast.
- Spoel je mond of poets je tanden na elke inhalatie.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof budesonide + formoterol zijn **geneesmiddelen die de luchtwegen verwijden en de ontsteking van de luchtwegen verminderen**.

Je arts schrijft budesonide + formoterol voor bij **astma of chronische bronchitis (COPD)**.

Astma is een ziekte van de luchtwegen waarbij je vaak periodes hebt van ademhalingsmoeilijkheden, hoesten en een piepende ademhaling.

COPD is een ziekte die wordt gekenmerkt door een langdurige vernauwing van de kleine luchtwegen, wat leidt tot ademnood, hoesten en slijmen.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die budesonide + formoterol bevatten. Klik op de naam van het geneesmiddel om te weten hoeveel budesonide + formoterol het bevat en in welke vorm het wordt toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen die naast budesonide + formoterol nog andere werkzame stoffen bevatten. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voor hiervoor een [nieuwe zoekopdracht](#) uit.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel? - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens de consultatie, vraag dan **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Fluticason + formoterol wordt voorgeschreven aan **volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar**. Onder strikte medische begeleiding kunnen ook jongere personen budesonide + formoterol gebruiken.

Je arts bepaalt hoeveel inhalaties per dag je nodig hebt. Dit hangt af van het merk van je inhalatie en de ernst van je aandoening. Volg het advies van je arts.

Jonge kinderen, sommige volwassenen en ouderen kunnen soms niet goed inademen op het juiste moment als het geneesmiddel vrijkomt, of kunnen hun adem niet lang genoeg inhouden. In deze gevallen is het beter om een [inhalator met voorzetkamer](#) te gebruiken.

Volg altijd de instructies van je apotheker voor het correct inhaleren van budesonide + formoterol. Een [goede inhalatietechniek](#) zorgt voor een betere werking van het geneesmiddel.

Je apotheker kan je een begeleidingsgesprek voor een "Goed Gebruik van Geneesmiddelen" (GGG) aanbieden. De apotheker zal samen met jou nagaan of je je inhalatoren correct gebruikt. Het GGG is gratis voor [astmapatiënten](#) en [COPD-patiënten](#).

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Gebruik budesonide + formoterol op **gelijk welk moment** van de dag, **met of zonder voedsel**. Kies een **vast tijdstip**.

Als je budesonide + formoterol verschillende keren per dag gebruikt, zorg er dan voor dat de **dosissen** gelijkmatig over de dag worden **verdeeld**.

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten op welk tijdstip en hoeveel keer per dag je budesonide + formoterol moet gebruiken.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Bespreek met je arts hoelang je budesonide + formoterol moet gebruiken.

Bespreek **langdurig gebruik** met je arts.

Het is mogelijk dat je budesonide + formoterol voor een **lange tijd** moet gebruiken. Je arts kan je behandeling echter aanpassen als dat nodig is, en dat kan betekenen dat je andere geneesmiddelen krijgt.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Een [goede inhalatietechniek](#) zorgt voor minder bijwerkingen.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden:

- moeite met ademen of slikken;
- zwelling van de tong, de lippen, het gezicht;
- huiduitslag, jeuk, netelroos (urticaria);

De meest voorkomende bijwerkingen van budesonide + formoterol zijn:

Vaak (van 1 tot 10 op 100 mensen)

- spraakproblemen;
- heesheid;
- irritatie van de keel;
- hoesten;
- schimmelinfectie van de mond of keel;
- longontsteking (bij COPD);
- hoofdpijn;
- beven;
- hartkloppingen.

Soms (bij minder dan 1 op 100 mensen)

- snelle hartslag;
- misselijkheid;
- duizeligheid;
- overmatige beweeglijkheid (psychomotorische hyperactiviteit);
- agressie, angst, slaapproblemen;
- wazig zicht;
- blauwe plekken;
- spierkrampen.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Nee, je mag een behandeling met budesonide + formoterol niet zomaar zonder medisch advies stoppen. Als je stopt met het gebruik van budesonide + formoterol kunnen de klachten en symptomen van je COPD of astma erger worden.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Gebruik je volgende dosis budesonide + formoterol wanneer het je invalt, of pas op het **volgende voorziene tijdstip** als het hiervoor bijna tijd is. Sla in dat geval de vergeten dosis over en ga gewoon verder met de behandeling.

Gebruik **nooit** een dubbele dosis budesonide + formoterol om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245).

Je kan volgende klachten krijgen:

- beven;
- hoofdpijn;
- snelle of onregelmatige hartslag.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je budesonide + formoterol gebruikt, behalve als je :

- je duizelig voelt;
- je slaperig voelt;
- een wazig of dubbel zicht hebt.

Enkel wanneer je deze klachten niet hebt, mag je een voertuig besturen of machines bedienen, maar blijf altijd voorzichtig.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken als je budesonide + formoterol gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van alcohol op budesonide + formoterol.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je budesonide + formoterol gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op budesonide + formoterol.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Budesonide + formoterol is veilig voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Ja, je mag budesonide + formoterol gebruiken tijdens de zwangerschap. Er zijn **geen negatieve effecten bekend**.

Als je astma hebt, is het belangrijk voor jou en je baby om je behandeling gewoon te blijven volgen. Tijdens je zwangerschap moeten symptomen van astma goed onder controle zijn.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Besprek** dan het gebruik van budesonide + formoterol met je arts of je apotheker.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag budesonide + formoterol gebruiken als je borstvoeding geeft. Er zijn **geen negatieve effecten**

bekend.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en budesonide + formoterol moet gebruiken.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Budesonide + formoterol kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- sommige geneesmiddelen die gebruikt worden voor de **behandeling van bepaalde hartproblemen** (bètablokkers);
- sommige geneesmiddelen tegen **hoge bloeddruk** (diuretica, de zogenaamde 'plaspillen');
- geneesmiddelen met **cortisone**;
- **theofylline**, een ander geneesmiddel bij COPD en astma.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Er zijn geen gezondheidssituaties bekend waarbij je budesonide + formoterol niet mag gebruiken.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van budesonide + formoterol, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen **niet** door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

Sommige **inhalatiemiddelen** zijn maar **beperkt houdbaar na opening**, bekijk hiervoor de bijsluiter.



Noteer hier al je vragen voor je arts, apotheker of andere zorgverlener.

FarmaInfo

een initiatief van het fagg[®]

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?

Neem contact op met je arts of apotheker.