



Belangrijk om te weten

- Gebruik buprenorfine **zo kort mogelijk en in de laagst mogelijke dosis**, behalve in een palliatieve situatie (tijdens de laatste fase van je leven).
- Drink best **geen alcohol** wanneer je buprenorfine gebruikt.
- Als je buprenorfine lange tijd gebruikt, kan dit leiden tot **verslaving en gewenning**.
- Zeker na een langdurige behandeling is **traag verminderen** noodzakelijk, in overleg met je arts of apotheker.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof buprenorfine zijn **zeer krachtige pijnstillers**.

Je arts schrijft buprenorfine voor bij **matige tot ernstige pijn**.

Buprenorfine wordt ook gebruikt bij de **behandeling van een verslaving aan morfine-achtige pijnstillers** (opioiden). Het zorgt ervoor dat er **geen ontwenningsverschijnselen** optreden. Bekijk voor meer informatie de fiche '[Buprenorfine bij een verslaving](#)'.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](#).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die buprenorfine bevatten. Je ziet er hoeveel buprenorfine ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen met buprenorfine die voor een andere aandoening worden gebruikt. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een [nieuwe zoekopdracht](#) uit.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker**.

Buprenorfine wordt voorgeschreven aan **volwassenen**. Onder strikte medische begeleiding kunnen ook jongere personen buprenorfine gebruiken.

Buprenorfine bestaat in **tabletvorm**: de begindosering is 200 tot 400 µg (microgram) om de 6 tot 8 uur.

Buprenorfine bestaat ook in **pleistervorm**: de begindosering is 35 µg (microgram) per uur.

De dosis buprenorfine wordt bepaald door je arts.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem buprenorfine in op **gelijk welk moment** van de dag, **met of zonder voedsel**. Je kiest best een **vast tijdstip**.

Wacht altijd **minstens 6 tot 8 uur** tussen twee innames.

Verwissel een pleister met buprenorfine **ten laatste na 96 uur** (4 dagen). Vervang de pleister telkens op **hetzelfde moment**. Met andere woorden, leg ten laatste om de 4 dagen een nieuwe pleister op, en dit telkens bijvoorbeeld 's ochtends.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

De **behandeling moet zo kort mogelijk** zijn. Je kan **verslaafd** worden aan buprenorfine. Dat wil zeggen dat wanneer het geneesmiddel is uitgewerkt, je het opnieuw nodig hebt om je goed te voelen. Hoe korter je buprenorfine gebruikt, hoe kleiner de kans dat dit gebeurt. Je geraakt ook **gewend** aan buprenorfine: hoe langer je buprenorfine gebruikt, hoe meer je nodig zal hebben om je pijn te verminderen. Bij een langdurig gebruik heb je ook een groter risico op **bijwerkingen**.

Je **arts** zal je pijn opvolgen en beslissen **hoelang je buprenorfine mag gebruiken**.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling en **neem contact op met je arts** wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn de symptomen van een zeer zeldzame, ernstige allergische reactie:

- zwelling van de handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel;
- slik- of ademhalingsproblemen;
- netelroos (urticaria);
- flauwvallen;
- gele kleur van de ogen of huid (geelzucht).

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van buprenorfine zijn de volgende:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 mensen)

- misselijkheid;
- blozen;
- jeuk.

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- duizeligheid, hoofdpijn;
- snelle en korte ademhaling;
- braken;
- verstopping van de darmen (constipatie);
- huiduitslag, zweten;
- vochtophoping (bv. opzwellen van de benen).

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- verwardheid, rusteloosheid, niet kunnen slapen;

- kalmte, vermoeidheid, sufheid (vooral tijdens de eerste dagen van de behandeling);
- lage bloeddruk;
- droge mond;
- moeilijkheden bij het plassen, minder plassen dan normaal.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Goed idee dat je wil stoppen, maar **nee**, je mag nooit zomaar zonder medisch advies met het gebruik van buprenorfine stoppen.

In één keer stoppen is gevaarlijk, vooral na langdurig gebruik. **Doe dit nooit alleen**. Je kan last krijgen van **ontwenningssverschijnselen** zoals angst, zweten en beven.

Het is dus **noodzakelijk** om na een langdurige behandeling met buprenorfine de dosis **traag te verminderen**. Bekijk samen met je **arts of apotheker** hoe je dit het best aanpakt. Zij kunnen je helpen om een schema op te stellen.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem contact op met je **arts of je apotheker** om te weten of je de vergeten dosis nog mag gebruiken en hoelang je moet wachten voor een volgende dosis.

Neem **nooit een dubbele dosis** buprenorfine of breng nooit een extra pleister aan om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Je kan volgende klachten krijgen:

- sufheid;
- misselijkheid;
- braken;
- grote of kleine pupillen;
- ademhalingsmoeilijkheden.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je mag geen voertuig besturen of machines bedienen als je buprenorfine gebruikt, en je:

- je **duizelig** voelt;

- je **slaperig** voelt;
- een **wazig of dubbel zicht** hebt.

Deze klachten kan je vooral hebben aan het **begin van de behandeling**, wanneer de **dosering** wordt **aangepast**, wanneer je bent **veranderd van pijnstillers**, wanneer je ook **andere geneesmiddelen** gebruikt die op de hersenen werken, of wanneer je **alcohol** drinkt.

Enkel wanneer je deze **klachten niet hebt**, mag je een **voertuig besturen of machines bedienen**, maar blijf **altijd voorzichtig!**

Volgens de wet mag je niet deelnemen aan het verkeer als je in een toestand van dronkenschap bent of in een soortgelijke toestand door het gebruik van geneesmiddelen.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je drinkt best geen alcohol als je buprenorfine gebruikt.

Alcohol versterkt de effecten van buprenorfine, wat ervoor kan zorgen dat je je slaperig en ziek voelt.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je mag niet alles eten als je buprenorfine gebruikt.

Je mag geen **pompelmoes** of **ander aanverwant citrusfruit** (zoals pomelo) eten. Ook **bereidingen op basis van deze vruchten** moet je vermijden.

Deze citrusvruchten kunnen het **effect van buprenorfine**, en de **bijwerkingen** ervan, versterken of **verlengen**. Dat kan leiden tot **ernstige ademhalingsproblemen**.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Buprenorfine wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Over het gebruik van buprenorfine tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te zijn dat het veilig is. Je arts zal de ernst van je symptomen afwegen tegen het risico voor je kind.

Als je buprenorfine gebruikt tijdens de zwangerschap, kan je **babymoeilijk ademen** en kan hij last krijgen van **ontwenningverschijnselen**.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van buprenorfine met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van buprenorfine wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding**.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en buprenorfine moet gebruiken.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Buprenorfine kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- sommige geneesmiddelen tegen **angst of slaapproblemen**;
- andere geneesmiddelen die **slaperigheid kunnen geven** zoals sommige geneesmiddelen bij allergie, andere slaapmiddelen, andere kalmeermiddelen, geneesmiddelen tegen stuipen (convulsies, epilepsie) en alcohol;
- sommige geneesmiddelen bij **depressie**;
- bepaalde geneesmiddelen kunnen de manier waarop buprenorfine door de lever wordt **afgebroken beïnvloeden**. Dit kan de **werkzaamheid veranderen** of het risico op **bijwerkingen verhogen**. Onder deze geneesmiddelen vallen onder andere:
 - sommige geneesmiddelen bij epilepsie;
 - sommige antibiotica;
 - sommige geneesmiddelen bij schimmelinfecties;
 - sommige geneesmiddelen bij kanker;
 - sommige geneesmiddelen bij hiv;
 - sommige geneesmiddelen bij taailsijmziekte;
 - sint-janskruid, een kruid bij depressie.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik buprenorfine niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij ernstige **ademhalingsstoornissen**, bij een astma-aanval of bij ernstige COPD (chronische obstructieve longziekte);
- bij **verhoogde druk in je hoofd**, bijvoorbeeld na een hoofdwonde of bij een hersenaandoening;
- bij **ernstige leverproblemen**;
- als je **veel alcohol drinkt of een alcoholverslaving** hebt;
- als je eerder geneesmiddelen, drugs of alcohol hebt **misbruikt**;
- bij een **darmverlamming**.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van buprenorfine, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Verwijder een pleister na 4 dagen gebruik. Vouw de kleverige kanten op elkaar en smijt deze in de **vuilbak**, buiten het zicht en bereik van kinderen. Breng een pleister die beschadigd is of die nog geen 4 dagen gebruikt werd, binnen **in de apotheek**.

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze

