



Belangrijk om te weten

- **Stop** onmiddellijk de behandeling met colchicine als je last hebt van **diarree, misselijkheid of braken**.
- Colchicine moet zo **snel mogelijk worden gestart**, zodra een jichtaanval begint.
- Colchicine is **giftig in hoge dosissen**. Het is dus belangrijk om je aan de dosis te houden en de behandeling te stoppen als de pijn weg is.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof colchicine zijn **geneesmiddelen tegen jicht**. Ze voorkomen de **vorming van urinezuur**.

Jicht is een afzetting van urinezuur in de gewrichten.

Je arts schrijft colchicine voor om **jichtaanvallen te behandelen of te voorkomen**.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die colchicine bevatten. Je ziet er hoeveel colchicine ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek met je arts, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

- Behandeling van een jichtaanval: je mag niet meer innemen dan **1,5 mg (milligram) per dag (24 uur)**.
- Voorkomen van een jichtaanval: je mag niet meer innemen dan **1 mg (milligram) per dag (24 uur)**.

Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem colchicine in op **gelijk welk moment** van de dag, **met of zonder voedsel**.

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten op welk tijdstip en hoeveel keer per dag je colchicine moet innemen.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Bespreek met je arts hoelang je colchicine moet innemen.

Gebruik colchicine **zo kort mogelijk**, behalve als je colchicine preventief gebruikt.

Als de **jichtaanval verdwenen** is, **stop dan** met het gebruik van colchicine.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn symptomen van een te hoge dosis: diarree, misselijkheid en braken.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van colchicine zijn de volgende:

- roodheid van de huid;
- ontsteking van de zenuwen na langdurig gebruik;
- schade aan je lever;
- een daling van het aantal witte bloedcellen.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Ja, je kan in één keer stoppen met het gebruik van colchicine. Als je symptomen verdwenen of niet meer hinderlijk zijn, doe je dit **best zo snel mogelijk**.

Als je colchicine echter neemt om een **jichtaanval te voorkomen**, kan er een **jichtaanval optreden wanneer je het gebruik van colchicine stopzet**.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem contact op met je **arts of je apotheker** om te weten of je de vergeten dosis nog mag gebruiken en hoelang je moet wachten voor een volgende dosis.

Neem **nooit een dubbele dosis** colchicine om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker** of bel het Antigifcentrum (070 245 245).

Je kan volgende klachten krijgen:

- braken;
- diarree;

- buikpijn.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je colchicine gebruikt.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je drinkt best geen alcohol als je colchicine gebruikt.

Alcohol kan een **jichtaanval** veroorzaken of erger maken.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je mag niet alles eten als je colchicine gebruikt.

Je mag **geen pompelmoes of ander aanverwant citrusfruit** (zoals pomelo) eten. Ook **bereidingen op basis van deze vruchten** moet je vermijden.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Colchicine wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Over het gebruik van colchicine tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te zijn dat het veilig is. Je arts zal de ernst van je symptomen afwegen tegen het risico voor je kind.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van colchicine met je arts of je apotheker.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van colchicine wordt uit voorzichtigheid **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding** omdat niet bekend is of colchicine wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Als je borstvoeding geeft en colchicine moet gebruiken, **bespreek dit dan met je arts of apotheker.**



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Colchicine kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen/producten:

- sommige geneesmiddelen bij **veel cholesterol in het bloed** (bv. statines en fibraten);
- bepaalde geneesmiddelen kunnen de manier waarop colchicine door de lever wordt **afgebroken beïnvloeden**. Dit kan de **werkzaamheid veranderen** of het risico op **bijwerkingen verhogen**. Onder deze geneesmiddelen vallen onder andere:
 - sommige geneesmiddelen bij epilepsie;
 - sommige antibiotica;

- sommige geneesmiddelen bij schimmelinfecties;
- sommige geneesmiddelen bij kanker;
- sommige geneesmiddelen bij hiv;
- sommige geneesmiddelen bij hartritmestoornissen;
- sommige geneesmiddelen bij transplantatie;
- sommige geneesmiddelen bij hoge bloeddruk of hartritmestoornissen;
- sommige geneesmiddelen bij taaislijmziekte;
- sint-janskruid, een kruid bij depressie.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik colchicine niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij een **mindere werking van de nieren** (nierinsufficiëntie);
- bij een **mindere werking van de lever** (leverinsufficiëntie).

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van colchicine, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 - 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

