



Belangrijk om te weten

- Gebruik fentanyl **zo kort mogelijk en in de laagst mogelijke dosis** gebruiken, behalve in een palliatieve situatie (tijdens de laatste fase van je leven).
- Drink best **geen alcohol** wanneer je fentanyl gebruikt.
- Als je fentanyl lange tijd gebruikt, kan dit leiden tot **verslaving en gewenning**.
- Zeker na een langdurige behandeling is **traag verminderen** noodzakelijk, in overleg met je arts of apotheker.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof fentanyl zijn **zeer krachtige pijnstillers**.

Je arts schrijft fentanyl voor bij **ernstige en langdurige pijn**.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die fentanyl bevatten. Je ziet er hoeveel fentanyl ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

De dosis fentanyl wordt bepaald en aangepast door je arts.

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet gebruiken. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker**.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Verwissel een pleister met fentanyl elke 72 uur op een ander deel van de huid. Vervang de pleister telkens op **hetzelfde moment**. Met andere woorden, leg elke 3 dagen (72 uren) een nieuwe pleister op, en dit telkens bijvoorbeeld 's ochtends.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Je **arts** zal je pijn opvolgen en beslissen **hoelang je fentanyl mag gebruiken**.

De **behandeling moet zo kort mogelijk** zijn. Je kan **verslaafd** worden aan fentanyl. Dat wil zeggen dat

wanneer het geneesmiddel is uitgewerkt, je het opnieuw nodig hebt om je goed te voelen. Hoe korter je fentanyl gebruikt, hoe kleiner de kans dat dit gebeurt. Je geraakt ook **gewend** aan fentanyl: hoe langer je fentanyl gebruikt, hoe meer je nodig zal hebben om je pijn te verminderen. Bij langdurig gebruik heb je ook een groter risico op **bijwerkingen**.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn de symptomen van een zeer zeldzame ernstige allergische reactie:

- zwelling van de handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel;
- slikproblemen;
- ademhalingsproblemen;
- netelroos (urticaria);
- flauwvallen;
- gele kleur van de ogen of huid (geelzucht).

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van fentanyl zijn de volgende:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 mensen)

- misselijkheid, braken;
- verstopping van de darmen (constipatie);
- slaperigheid;
- duizeligheid;
- hoofdpijn.

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- allergische reactie;
- verlies van eetlust;
- slaapproblemen;
- depressie, gevoelens van angst of verwarring;
- dingen zien, horen, ruiken, proeven of voelen die er niet zijn (hallucinaties);
- spiertrillingen of spasmen;
- ongewoon gevoel in de huid, zoals tintelend of kriebelend gevoel;
- draaierigheid;
- hartkloppingen, hoge bloeddruk;
- kortademigheid;
- diarree;
- droge mond;
- maagpijn of maagzuur;
- veel zweten;
- jeuk en huiduitslag;
- blozen;
- niet kunnen plassen of je blaas niet (volledig) kunnen ledigen bij het plassen;
- vermoeidheid, verzwakking;
- koud voelen;
- gezwollen handen, enkels of voeten.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- onrustigheid, het niet meer kunnen herkennen van mensen en dingen, het niet weten waar je bent of het niet begrijpen van tijd (desoriëntatie);
- een sterk gevoel van blijdschap en geluk, alsof alles helemaal perfect is (euforie);
- minder gevoel in de huid;
- geheugenverlies;
- wazig zien;
- trage hartslag of lage bloeddruk;
- blauwe verkleuring van de huid als gevolg van een laag zuurstofgehalte in het bloed;
- darmverlamming;
- jeukende huiduitslag (eczeem), allergische reactie of andere huidaandoening op de plaats waar de pleister is aangebracht;
- griepachtige klachten;
- gevoelsmatige verandering in lichaamstemperatuur;
- koorts;
- moeilijkheden om een erectie te krijgen (impotentie) of problemen bij het hebben van seks.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Nee, je mag een behandeling met fentanyl niet zomaar zonder medisch advies stoppen.

In één keer stoppen is gevaarlijk, vooral na langdurig gebruik. **Doe dit nooit alleen**. Je kan last krijgen van **ontwenningverschijnselen** zoals angst, zweten en beven. Het is dus noodzakelijk om na een langdurige behandeling met fentanyl de dosis **traag te verminderen**. Bekijk samen met je **arts of apotheker** hoe je dit het best aanpakt. Zij kunnen je helpen om een schema op te stellen.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem contact op met je **arts of je apotheker** om te weten of je de vergeten dosis nog mag gebruiken en hoelang je moet wachten voor een volgende dosis.

Breng **nooit een extra pleister aan**.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Je kan volgende klachten krijgen:

- sufheid,
- vermoeidheid,
- slaperigheid;
- flauw voelen;
- duizeligheid;

- ademhalingsmoeilijkheden;
- niet meer helder nadenken;
- niet meer normaal lopen;
- problemen met praten.

Je kan **sterven** door een overdosis met fentanyl.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je mag geen voertuig besturen of machines bedienen als je fentanyl gebruikt, en je:

- je **duizelig** voelt;
- je **slaperig** voelt;
- een **wazig of dubbel** zicht hebt.

Deze klachten kan je vooral hebben aan het **begin van de behandeling**, wanneer de **dosering** wordt **aangepast**, wanneer je bent **veranderd van pijnstillers**, wanneer je ook **andere geneesmiddelen** gebruikt die op de hersenen werken, of wanneer je **alcohol** drinkt.

Enkel wanneer je deze **klachten niet hebt**, mag je een **voertuig besturen of machines bedienen**, maar blijf **altijd voorzichtig!**

Volgens de wet mag je niet deelnemen aan het verkeer als je in een toestand van dronkenschap bent of in een soortgelijke toestand door het gebruik van geneesmiddelen.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je drinkt best geen alcohol als je fentanyl gebruikt.

Alcohol versterkt de effecten van fentanyl, wat ervoor kan zorgen dat je je slaperig en ziek voelt.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je mag niet alles eten als je fentanyl gebruikt.

Je mag geen **pompelmoes** of **ander aanverwant citrusfruit** (zoals pomelo) eten. Ook **bereidingen op basis van deze vruchten** moet je vermijden.

Deze citrusvruchten kunnen het **effect van fentanyl**, en de **bijwerkingen** ervan, versterken of **verlengen**. Dat kan leiden tot **ernstige ademhalingsproblemen**.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Fentanyl wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Het gebruik van fentanyl wordt **afgeraden tijdens de zwangerschap**.

Als je fentanyl gebruikt tijdens de zwangerschap, kan je **babymoeilijk ademen** en kan hij last krijgen van **ontwenningverschijnselen**.

De **arts kan beslissen** om toch fentanyl voor te schrijven tijdens je zwangerschap en zal dit verder met jou goed opvolgen.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van fentanyl met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van fentanyl wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding**.

Je moet **stoppen met borstvoeding** geven tijdens het gebruik van fentanyl, en **72 uur wachten na verwijdering van de pleister**. Je kan uiteraard wel je melk afkolven om de melkproductie op gang te houden, maar deze afgekolfde melk mag je niet aan je baby geven.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en fentanyl moet gebruiken.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Fentanyl kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- sommige geneesmiddelen bij **angst** of **slaapproblemen**;
- andere geneesmiddelen die **slaperigheid kunnen geven** zoals sommige geneesmiddelen bij allergie, andere slaapmiddelen, andere kalmeermiddelen, geneesmiddelen tegen stuipen (convulsies, epilepsie) en **alcohol**;
- sommige geneesmiddelen bij **depressie**;
- bepaalde geneesmiddelen kunnen de manier waarop fentanyl door de lever wordt **afgebroken beïnvloeden**. Dit kan de **werkzaamheid veranderen** of het risico op **bijwerkingen verhogen**. Onder deze geneesmiddelen vallen onder andere:
 - sommige geneesmiddelen bij epilepsie;
 - sommige antibiotica;
 - sommige geneesmiddelen bij schimmelinfecties;
 - sommige geneesmiddelen bij kanker;
 - sommige geneesmiddelen bij hiv;
 - sommige geneesmiddelen bij hartritmestoornissen;
 - sommige geneesmiddelen bij transplantatie;
 - sommige geneesmiddelen bij hoge bloeddruk of hartritmestoornissen;
 - sommige geneesmiddelen bij taaislijmziekte;
 - sint-janskruid, een kruid bij depressie.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik fentanyl niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij ernstige **ademhalingsstoornissen**, bij een astma-aanval of bij ernstige COPD (chronische obstructieve longziekte);
- bij **verhoogde druk in je hoofd**, bijvoorbeeld na een hoofdwonde of bij een hersenaandoening;
- als je **veel alcohol drinkt of een alcoholverslaving** hebt;
- als je eerder geneesmiddelen, drugs of alcohol hebt **misbruikt**;
- bij een **darmverlamming**;

- bij een **plotse, kortdurende pijn** zoals na een operatie;
- als je een **operatie** moet ondergaan.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van fentanyl, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Verwijder een pleister na 3 dagen gebruik. Vouw de kleverige kanten op elkaar en smijt deze in de **vuilbak**, buiten het zicht en bereik van kinderen. Breng een pleister die beschadigd is of die nog geen 3 dagen gebruikt werd, binnen **in de apotheek**.

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

