



Belangrijk om te weten

- Drink best **geen alcohol** wanneer je gliclazide gebruikt.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof gliclazide **verlagen de hoeveelheid suiker in het bloed**.

Je arts schrijft gliclazide voor bij **suikerziekte type 2** (diabetes type 2).



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die gliclazide bevatten. Je ziet er hoeveel gliclazide ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet gebruiken en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek met je arts, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Gliclazide wordt voorgeschreven aan **volwassenen**.

Jouw dosering wordt altijd bepaald aan de hand van je **bloedresultaten**. Je arts zal beginnen met een **lage dosis bij de start** van de behandeling met gliclazide. Die kan dan, indien nodig, **verhoogd worden**.

Je **mag niet meer innemen dan 120 mg (milligram) per dag** (24 uur), in één inname. Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem gliclazide 's ochtends in, **bij het ontbijt**.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Het is mogelijk dat je gliclazide voor een **lange tijd of zelfs levenslang** moet gebruiken. De arts kan je behandeling echter aanpassen als dat nodig is, en dat kan betekenen dat je andere geneesmiddelen krijgt.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van gliclazide zijn de volgende:

- te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie);
- gewichtstoename;
- maag- en darmproblemen;
- huidreacties, zonneallergie.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Nee, je mag een behandeling met gliclazide niet zomaar zonder medisch advies stoppen.

Wil je toch stoppen, dan moet je dit eerst **bespreken met je arts**. Zo kunnen jullie samen bekijken hoe je suikerziekte verder kan worden behandeld, want het is erg belangrijk dat het suikergehalte in je bloed niet te hoog is.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis gliclazide op het **volgende voorziene tijdstip**.

Neem **nooit een dubbele dosis** gliclazide om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Je kan volgende klachten krijgen:

- hoofdpijn;
- honger;
- beven;
- zwakte;
- duizeligheid;
- zweten;
- droge mond;
- rusteloosheid;
- agressie;
- te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie);
- verlies van bewustzijn.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je dapagliflozine gebruikt, **behalve** als de volgende symptomen optreden:

- hoofdpijn;
- honger;
- beven;
- je zwak voelen;
- je duizelig voelen;
- zweten;
- droge mond;
- je rusteloos voelen;
- je agressief voelen;
- als je diabetes niet goed onder controle is.

Je vermogen om je te concentreren of om te reageren kan afnemen, en je kan gezichtsproblemen krijgen. Je kan ook het bewustzijn verliezen.

Als je diabetespatiënt bent, moet je dus voorzichtig zijn als je vaak een hypoglykemie hebt of als je weinig symptomen vertoont wanneer je een hypoglykemie hebt. Je kan ook een hypoglykemie hebben als je nog geen symptomen hebt. Voor mensen met diabetes bestaat er trouwens een [bijzondere regelgeving met betrekking tot het rijbewijs](#).

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je drinkt best geen alcohol als je gliclazide gebruikt.

De combinatie van grote hoeveelheden **alcohol** en gliclazide heeft een negatieve invloed op je bloedsuikerspiegel en die combinatie **verhoogt het risico** op een **melkzuurvergiftiging**.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het is belangrijk om de **voedingsaanbevelingen op te volgen**. Indien je hierover vragen hebt, aarzel niet om een diëtist te raadplegen.

Ja, je mag alles eten als je gliclazide gebruikt. Maar het is belangrijk om je aan het dieet te houden.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op gliclazide.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Gliclazide wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Over het gebruik van gliclazide tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te zijn dat het veilig is. Je arts zal de ernst van je symptomen afwegen tegen het risico voor je kind.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van gliclazide met **je arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van gliclazide wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding**.

Over het gebruik van gliclazide tijdens de borstvoeding is **onvoldoende bekend** om zeker te zijn dat het veilig is.

Besprek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en gliclazide moet gebruiken.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Gliclazide kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- sommige geneesmiddelen bij een **hoge bloeddruk**;
- **fibraten**, geneesmiddelen bij hoge cholesterol;
- sommige **antibiotica**;
- sommige geneesmiddelen bij een **schimmelinfectie**;
- andere geneesmiddelen tegen **suikerziekte** (met name insuline).

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik gliclazide niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- als je **diabetes type 1** (een andere vorm van suikerziekte) hebt;
- bij een **mindere werking van de nieren** (nierinsufficiëntie);
- bij een **mindere werking van de lever** (leverinsufficiëntie);
- **melkzuurvergiftiging** (complicatie die verband houdt met suikerziekte wanneer het bloed zuur wordt).

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van gliclazide, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".



 Noteer hier al je vragen voor je arts, apotheker of andere zorgverlener.

FarmaInfo
een initiatief van het fagg[®]

FarmaInfo
een initiatief van het fagg[®]

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmalInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?

Neem contact op met je arts of apotheker.