

Lamotrigine

Werkzame stof

Belangrijk om te weten

- Lamotrigine wordt voorgeschreven bij **epilepsie** en **bipolaire stoornissen**.
- Lamotrigine mag worden gebruikt bij **zwangere vrouwen** en vrouwen die **borstvoeding** geven.

Tijdelijke informatie

Stop nooit met het innemen van lamotrigine **zonder medisch advies**, zelfs niet voor één dag. Als je moeite hebt om je behandeling correct te volgen: [hier](#) vind je nuttige tips!

Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof lamotrigine zijn **anti-epileptica**.

- Je arts kan lamotrigine voorschrijven voor **epilepsie** bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar.
- Je arts kan lamotrigine voorschrijven voor **bipolaire stoornissen** bij volwassenen.

Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](#).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die lamotrigine bevatten. Je ziet er hoeveel lamotrigine ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek met je arts, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Lamotrigine wordt voorgeschreven aan **volwassenen en aan kinderen vanaf 2 jaar**. De dosissen moeten laag zijn aan het begin van de behandeling en, indien nodig, geleidelijk worden verhoogd.

- Kinderen tot 12 jaar: je **mag niet meer innemen dan 200 mg (milligram) per dag** (24 uur).
- Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar: je **mag niet meer innemen dan 400 mg (milligram) per dag** (24 uur). Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten hoeveel keer per dag je lamotrigine moet gebruiken.

Neem lamotrigine in op **gelijk welk moment** van de dag, **met of zonder voedsel**. Bij langdurig gebruik kies je best een **vast tijdstip**.

Als je verschillende keren per dag lamotrigine gebruikt, zorg er dan voor dat de **dosissen gelijkmatig over de dag worden gespreid**.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Bespreek met je arts hoelang je lamotrigine moet gebruiken. De behandeling duurt meestal erg lang.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van lamotrigine zijn de volgende:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 mensen)

- hoofdpijn;
- huidreacties zoals roodheid (dit kan ernstig zijn en komt vooral voor aan het begin van de behandeling).

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- agressiviteit of prikkelbaarheid;
- zin om te slapen of slaperigheid;
- duizeligheid, beven, rillingen;
- slapeloosheid;
- rusteloosheid;
- diarree, misselijkheid, braken;
- droge mond;
- pijn in de rug of gewrichten, of elders.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- onhandigheid en gebrek aan coördinatie;
- dubbel of troebel zicht;
- ongewone haaruitval of dunner wordend haar;
- huiduitslag of zonnebrand na blootstelling aan de zon of aan kunstlicht.

Lamotrigine kan je **huid gevoeliger maken voor zonlicht**. Daardoor kan je huid sneller verbranden en blaren krijgen.

Bescherm daarom je huid tegen zonlicht. Hoe je dit kan doen, kan je lezen in het thema '[Opgelet voor zonlicht bij bepaalde geneesmiddelen](#)'. Gelukkig komt deze bijwerking niet veel voor, maar voorkomen is altijd beter dan genezen!

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).

Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Nee, je mag een behandeling met lamotrigine niet zomaar zonder medisch advies stoppen.

Als je lamotrigine gebruikt voor epilepsie en je je behandeling plotseling stopzet, kunnen er opnieuw epileptische aanvallen optreden.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis lamotrigine op het **volgende voorziene tijdstip**.

Neem **nooit een dubbele dosis** lamotrigine om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245) .

Je kan volgende klachten krijgen:

- je voelt je heel slaperig;
- je bent onhandig en je verliest je evenwicht;
- je hartritme verandert;
- je kan het bewustzijn verliezen.

Mag ik met de auto rijden? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik met de auto rijden of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag met de auto rijden of machines bedienen als je lamotrigine gebruikt, **behalve** als je epilepsie dit niet toelaat. **Blijf altijd voorzichtig.**

Als je epilepsie hebt, praat dan met je arts over autorijden en het bedienen van machines.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je drinkt best geen alcohol.

Alcohol verergert de **epileptische aanvallen** en **versterkt** de **bijwerkingen** van lamotrigine.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je lamotrigine gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op lamotrigine.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Lamotrigine mag worden gebruikt bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Ja, je mag lamotrigine gebruiken tijdens de zwangerschap, in de laagst mogelijke dosis.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van lamotrigine met je arts en/of je apotheker.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag lamotrigine gebruiken als je borstvoeding geeft. Lamotrigine gaat over in de moedermelk waardoor je kind slaperig kan zijn.

Als je borstvoeding geeft en lamotrigine wil gebruiken, **bespreek dit dan met je arts en/of apotheker** .

Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Lamotrigine kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts en/of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- sommige geneesmiddelen tegen **epilepsie** (valproaat);
- sommige geneesmiddelen voor de behandeling van **psychiatrische stoornissen**;
- **hormonale anticonceptie** kan de concentratie van lamotrigine in het bloed verlagen.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit](#)

[geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik lamotrigine niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts en/of apotheker:

- **allergie** voor lamotrigine.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van lamotrigine, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: ['Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'](#). Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25 °C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem contact op met je arts of apotheker.