



Belangrijk om te weten

- Gebruik morfine **zo kort mogelijk en in de laagst mogelijke dosis**, behalve in een palliatieve situatie (tijdens de laatste fase van je leven).
- Drink best **geen alcohol** wanneer je morfine gebruikt.
- Als je morfine lange tijd gebruikt, kan dit leiden tot **verslaving en gewenning**.
- Zeker na een langdurige behandeling is **traag verminderen** noodzakelijk, in overleg met je arts of apotheker.
- Morfinetabletten mogen **in geen enkel geval gesneden, gekauwd of verbrijzeld worden**.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof morfine zijn **zeer krachtige pijnstillers**.

Je arts schrijft morfine voor bij **matige tot ernstige pijn**.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die morfine bevatten. Je ziet er hoeveel morfine ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

De dosis morfine wordt bepaald en aangepast door je arts.

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker**.

Morfinetabletten mogen **in geen enkel geval gesneden, gekauwd of verbrijzeld worden**. Het innemen van vermalen of opgeloste tabletten kan ervoor zorgen dat er een te grote hoeveelheid morfine direct in het lichaam vrijkomt.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem morfine in op **gelijk welk moment** van de dag, **met of zonder voedsel**. Bij langdurig gebruik kies je best een **vast tijdstip**.

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten op welk tijdstip en hoeveel keer per dag je morfine

moet innemen.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

De **behandeling moet zo kort mogelijk** zijn, behalve in een palliatieve situatie.

Je kan **verslaafd** worden aan morfine. Dat wil zeggen dat wanneer het geneesmiddel is uitgewerkt, je het opnieuw nodig hebt om je goed te voelen. Hoe korter je morfine gebruikt, hoe kleiner de kans dat dit gebeurt. Je geraakt ook **gewend** aan morfine: hoe langer je morfine gebruikt, hoe meer je nodig zal hebben om je pijn te verminderen. Bij langdurig gebruik heb je ook een groter risico op **bijwerkingen**.

Je **arts** zal je pijn opvolgen en beslissen **hoelang je morfine mag gebruiken**.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn de symptomen van een zeer zeldzame ernstige allergische reactie:

- kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden;
- zwelling van oogleden, gezicht of lippen;
- huiduitslag of jeuk.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van morfine zijn de volgende:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 mensen)

- misselijkheid;
- verstopping van de darmen (constipatie).

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- verwardheid, niet kunnen slapen, sufheid;
- duizeligheid, hoofdpijn;
- onvrijwillige spiertrekkingen;
- buikpijn, verlies van eetlust;
- droge mond;
- braken;
- zweten;
- huiduitslag;
- je zwak voelen;
- vermoeidheid;
- jeuk.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- overgevoeligheid;
- agitatie;
- een sterk gevoel van blijdschap en geluk, alsof alles helemaal perfect is (euforie);
- dingen zien, horen, ruiken, proeven of voelen die er niet zijn (hallucinaties);
- veranderingen in je humeur;
- epilepsie aanvallen (convulsies);
- verhoogde spanning in je spieren, rillingen;
- verstoring van je gevoelswaarneming;

- draaiduizeligheid, flauwvallen;
- wazig zien;
- blozen;
- lage bloeddruk;
- vocht in de longen, tragere en minder diepe ademhaling, samentrekking van de luchtwegen;
- veranderde smaak, verstoorde spijsvertering;
- netelroos (urticaria);
- je blaas niet (volledig) kunnen ledigen bij het plassen;
- vochtophoping in de benen.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Nee, je mag een behandeling met morfine niet zomaar zonder medisch advies stoppen.

In één keer stoppen is gevaarlijk, vooral na langdurig gebruik. **Doe dit nooit alleen**. Je kan last krijgen van **ontwenningssverschijnselen** zoals angst, zweten en beven. Het is dus noodzakelijk om na een langdurige behandeling met morfine de dosis **traag te verminderen**. Bekijk samen met je **arts of apotheker** hoe je dit het best aanpakt. Zij kunnen je helpen om een schema op te stellen.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem contact op met je **arts of je apotheker** om te weten of je de vergeten dosis nog mag innemen en hoelang je moet wachten voor een volgende dosis.

Neem **nooit een dubbele dosis** morfine om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker** of bel het Antgifcentrum (070 245 245).

Je kan volgende klachten krijgen:

- vermoeidheid, slaperigheid;
- lage bloeddruk;
- ademhalingsmoeilijkheden;
- braken;
- kleine of grote pupillen;
- coma.

Je kan **sterven** door een overdosis met morfine.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je mag geen voertuig besturen of machines bedienen als je morfine gebruikt, en je:

- je **duizelig** voelt;
- je **slaperig** voelt;
- een **wazig of dubbel zicht** hebt.

Deze klachten kan je vooral hebben aan het **begin van de behandeling**, wanneer de **dosering** wordt **aangepast**, wanneer je bent **veranderd van pijnstillers**, wanneer je ook **andere geneesmiddelen** gebruikt die op de hersenen werken, of wanneer je **alcohol** drinkt.

Als je deze klachten niet hebt, mag je enkel **met de auto rijden of machines bedienen** als je **voldoende lang wacht** na de inname van morfine. **Bespreek dit met je arts.**

Volgens de wet mag je niet deelnemen aan het verkeer als je in een toestand van dronkenschap bent of in een soortgelijke toestand door het gebruik van geneesmiddelen.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je drinkt best geen alcohol als je morfine gebruikt.

Alcohol versterkt de effecten van morfine, wat ervoor kan zorgen dat je je slaperig en ziek voelt.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je morfine gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op morfine.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Morfine wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Over het gebruik van morfine tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te zijn dat het veilig is. Je arts zal de ernst van je symptomen afwegen tegen het risico voor je kind

Als je morfine gebruikt tijdens de zwangerschap, kan je **babymoeilijk ademen** en kan hij last krijgen van **ontweningsverschijnselen**.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van morfine met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van morfine wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding**.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en morfine moet gebruiken.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Morfine kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende

geneesmiddelen/producten:

- sommige geneesmiddelen bij **angst of slaapproblemen**;
- andere geneesmiddelen die **slaperigheid** kunnen geven zoals sommige geneesmiddelen bij allergie, andere slaapmiddelen, andere kalmeermiddelen, geneesmiddelen tegen stuipen (convulsies, epilepsie) en alcohol;
- sommige geneesmiddelen bij **depressie**;
- geneesmiddelen die **toevallen of stuipen** (aanvallen van bewusteloosheid met spiertrekkingen) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van een depressie of een psychose;
- sommige geneesmiddelen die het **vormen van bloedklonters tegengaan** (bloedverdunners);
- sommige geneesmiddelen bij een **hoge bloeddruk**;
- bepaalde geneesmiddelen kunnen de manier waarop morfine door de lever wordt **afgebroken beïnvloeden**. Dit kan de **werkzaamheid veranderen** of het risico op **bijwerkingen verhogen**. Onder deze geneesmiddelen vallen onder andere:
 - sommige antibiotica;
 - sommige geneesmiddelen bij hartritmestoornissen;
 - sommige geneesmiddelen bij transplantatie;
 - sommige geneesmiddelen bij schimmelinfecties;
 - sommige geneesmiddelen bij kanker;
 - sommige geneesmiddelen bij hiv;
 - sommige geneesmiddelen bij hoge bloeddruk of hartritmestoornissen;
 - sint-janskruid, een kruid bij depressie.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiters. De bijsluiters vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik morfine niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij ernstige **ademhalingsstoornissen**, bij een astma-aanval of bij ernstige COPD (chronische obstructieve longziekte);
- bij **verhoogde druk in je hoofd**, bijvoorbeeld na een hoofdwonde of bij een hersenaandoening;
- als je veel **alcohol drinkt of een alcoholverslaving** hebt;
- als je eerder geneesmiddelen, drugs of alcohol hebt **misbruikt**;
- bij een **darmverlamming**;
- bij een **mindere werking van de lever** (leverinsufficiëntie);
- als je een **operatie** moet ondergaan.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van morfine, staat in de bijsluiters. De bijsluiters vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

