Oxybutynine

Werkzame stof

FarmaInfo
een initiatief van het fagg

Belangrijk om te weten

- Je kan last krijgen van **misselijkheid, buikpijn, verstopping van de darmen, droge mond en droge huid** door oxybutynine (vooral bij ouderen).
- Je kan je overdag **slaperig of duizelig** voelen door oxybutynine (vooral bij ouderen).
- Drink best **geen alcohol** wanneer je oxybutynine gebruikt.

Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof oxybutynine zijn **anticholinergica.**

Je arts schrijft oxybutynine voor bij **een overactieve blaas of klachten van een overactieve blaas zoals:**

- vaker dan normaal plassen;
- het gevoel hebben dat je vaak moet plassen;
- ongewild verliezen van urine (urine-incontinentie).

Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op FarmaInfo.be.

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die oxybutynine bevatten. Je ziet er hoeveel oxybutynine ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen met oxybutynine die op een andere manier worden toegediend. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een nieuwe zoekopdracht uit.

Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Oxybutynine wordt voorgeschreven aan **volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar**.

Je mag **niet meer innemen dan 15 mg (milligram) per dag** (24 uur), tenzij je arts dit anders voorschrijft. Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem oxybutynine in op **gelijk welk moment** van de dag, **met of zonder voedsel**. Bij langdurig gebruik kies je best een **vast tijdstip**.

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten op welk tijdstip en hoeveel keer per dag je oxybutynine moet innemen.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Bespreek met je arts hoelang je oxybutynine moet gebruiken.

Het is mogelijk dat je oxybutynine voor een **lange tijd** moet gebruiken. De arts kan je behandeling echter aanpassen als dat nodig is, en dat kan betekenen dat je andere geneesmiddelen krijgt.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn de symptomen van een allergische reactie :

- je lippen, tong en huid zwellen op, ademhalingsmoeilijkheden, slikproblemen;
- jeuk en huiduitslag.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van oxybutynine zijn de volgende:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 mensen)

- verstopping van de darmen (constipatie);
- misselijkheid;
- droge mond;
- duizeligheid, slaperigheid;
- hoofdpijn;
- droge huid.

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- hartritmestoornissen;
- verwardheid;
- rood gezicht, verwijden van de bloedvaten (vasodilatatie);
- diarree, braken;
- je blaas niet (volledig) kunnen ledigen bij het plassen;
- droge ogen.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- het niet meer kunnen herkennen van mensen en dingen, het niet weten waar je bent of het niet begrijpen van tijd (desoriëntatie);
- buikpijn, gebrek aan eetlust (anorexie);
- slikproblemen (dysfagie);
- vermoeidheid.

Oxybutynine kan je **huid gevoeliger maken voor zonlicht**. Daardoor kan je huid sneller verbranden en blaren krijgen. **Bescherm daarom je huid tegen zonlicht.** Hoe je dit kan doen, kan je lezen in het thema ‘Opgelet voor zonlicht bij bepaalde geneesmiddelen’. Gelukkig komt deze bijwerking niet veel voor, maar voorkomen is altijd beter dan genezen!

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: 'Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan het FAGG.



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Ja, je kan in één keer stoppen met het gebruik van oxybutynine. Je klachten van een overactieve blaas kunnen terugkeren. Bespreek dit met je arts of apotheker.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis oxybutynine op het **volgende voorziene tijdstip**.

Neem **nooit een dubbele dosis** oxybutynine om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Er zijn **geen symptomen** bekend van overdosering.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je oxybutynine gebruikt,**behalve** als je:

- je **duizelig** voelt;
- je **slaperig** voelt.

Enkel wanneer je deze **klachten niet hebt**, mag je **met de auto rijden of machines bedienen,** maar **blijf altijd voorzichtig**.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je drinkt best geen alcohol als je oxybutynine gebruikt.

Alcohol versterkt de slaapverwekkende **effecten van oxybutynine.**

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je oxybutynine gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op oxybutynine.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Oxybutynine wordt afgeraden voor zwangere vrouwen.

Oxybutynine is veilig voor een korte periode voor vrouwen die borstvoeding geven. Langdurig gebruik wordt afgeraden.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Over het gebruik van oxybutynine tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te zijn dat het veilig is. Je arts zal de ernst van je symptomen afwegen tegen het risico voor je kind

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van oxybutynine met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag oxybutynine voor een korte periode gebruiken als je borstvoeding geeft. Er zijn **geen negatieve effecten bekend bij een kortdurende behandeling**.

Langdurig gebruik van oxybutynine wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding**.

De arts kan beslissen om toch oxybutynine voor te schrijven tijdens de borstvoeding en zal dit verder met jou goed opvolgen.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en oxybutynine moet gebruiken.

Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Oxybutynine kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen of producten:

- andere geneesmiddelen met een **anticholinerge werking** (bv. verdovende middelen en geneesmiddelen bij psychische ziekten en depressie);
- **amantadine**, een geneesmiddel bij de ziekte van Parkinson;
- sommige geneesmiddelen bij **allergie**;
- sommige geneesmiddelen bij **psychische ziektes en depressie**;
- sommige geneesmiddelen bij **hartproblemen;**
- **dipyridamol**, een bloedverdunner;
- geneesmiddelen tegen **osteoporose** (bisfosfonaten);
- bepaalde geneesmiddelen kunnen de manier waarop oxybutynine door de lever wordt**afgebroken beïnvloeden**. Dit kan de **werkzaamheid veranderen** of het risico op **bijwerkingen verhogen**. Onder deze geneesmiddelen vallen onder andere:
  - sommige geneesmiddelen bij epilepsie;
  - sommige antibiotica;
  - sommige geneesmiddelen bij schimmelinfecties;
  - sommige geneesmiddelen bij kanker;
  - sommige geneesmiddelen bij hiv;
  - sommige geneesmiddelen bij taaislijmziekte;
  - sint-janskruid, een kruid bij depressie.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: ‘Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?’. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik oxybutynine niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- als je je **blaas niet (volledig) kan ledigen bij het plassen;**
- als je een **ernstige aandoening van de maag of darmen** hebt;
- bij bepaalde aandoeningen van **spierzwakte** (myasthenia gravis);
- als je **staar** (glaucoom) hebt.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van oxybutynine, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: 'Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik hier voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

Noteer hier al je vragen voor je arts, apotheker of andere zorgverlener.

FarmaInfo
een initiatief van het fagg

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem contact op met je arts of apotheker.