



### Belangrijk om te weten

- Gebruik **geen** perindopril tijdens de zwangerschap.
- Je kan last krijgen van een vervelende **hoest** door perindopril. Dit kan bij het begin van je behandeling ontstaan, maar ook pas na jaren behandeling.
- Als je één of meerdere van de volgende symptomen krijgt, moet je **debehandeling stoppen en contact opnemen met je arts**:
  - zwelling van je gezicht, je lippen, je tong of je keel;
  - zwelling van je handen of voeten;
  - slikproblemen;
  - ademhalingsmoeilijkheden.

Dit zijn de symptomen van een **ernstige allergische reactie**.



### Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof perindopril **doen de bloedvaten verwijderen**. Daardoor **daalt je bloeddruk** en kan je **hart** het bloed **gemakkelijker** door je bloedvaten **pompen**.

Je arts schrijft perindopril voor:

- bij een **hoge bloeddruk**;
- bij een **mindere werking van het hart** (hartfalen);
- om **hartproblemen** zoals een hartaanval te **voorkomen**.



### Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die perindopril bevatten. Je ziet er hoeveel perindopril ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen die naast perindopril nog andere werkzame stoffen bevatten. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een [nieuwe zoekopdracht](#) uit.



### Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

#### Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en

werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Perindopril wordt voorgeschreven aan **volwassenen**.

Je mag **niet meer innemen dan 10 mg (milligram) per dag** (24 uur). Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

### Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem perindopril in **vóór een maaltijd**, op **gelijk welk moment** van de dag. Bij langdurig gebruik kies je best een **vast tijdstip**.

### Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

**Bespreek met je arts** hoelang je perindopril moet gebruiken.

Het is mogelijk dat je perindopril voor een lange tijd of zelfs levenslang moet gebruiken. De arts kan je behandeling echter aanpassen als dat nodig is, en dat kan betekenen dat je andere geneesmiddelen krijgt.



### Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn de symptomen van een **ernstige allergische reactie** met vochtophoping op verschillende plaatsen van je lichaam (angio-oedeem):

- zwelling van je gezicht, je lippen, je tong of je keel;
- zwelling van je handen of voeten;
- slikproblemen;
- ademhalingsmoeilijkheden.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van perindopril zijn de volgende:

#### Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- lage bloeddruk;
- hoest (dit kan aan de start van de behandeling maar ook pas na jaren behandeling);
- benauwdheid, kort van adem zijn;
- hoofdpijn;
- duizeligheid;
- prikkend, tintelend of brandend gevoel;
- oorsuizen;
- problemen met je zicht;
- braken en misselijkheid;
- diarree;
- verstopping van je darmen (constipatie);
- buikpijn;
- problemen met je vertering;
- veranderingen in smaak;
- uitslag op je huid, jeuk;
- vermoeidheid;

- spierkramp.

#### Soms (tot 1 op 100 mensen)

- hartkloppingen;
- je hartslag versnelt;
- zwelling van je gezicht, lippen, ledematen, tong en je keel;
- slaapproblemen;
- je minder goed voelen, depressieve gevoelens hebben;
- slaperigheid;
- flauwvallen;
- ontsteking in je bloedvaten;
- droge mond;
- jeukende bulten op je huid (netelroos);
- gevoeligheid aan licht en zon;
- auto-immuunziekte van je huid;
- veel zweten;
- verminderde werking van je nieren;
- erectieproblemen;
- pijn in je gewrichten;
- pijn in je spieren;
- pijn op je borst;
- koorts;
- je algemeen ziek voelen;
- verlaging van het gehalte suiker in je bloed;
- te hoog kaliumgehalte in het bloed;
- te laag natriumgehalte in het bloed.

Perindopril kan je **huid gevoeliger maken voor zonlicht**. Daardoor kan je huid sneller verbranden en blaren krijgen. **Bescherm daarom je huid tegen zonlicht**. Hoe je dit kan doen, kan je lezen in het thema '[Opgelet voor zonlicht bij bepaalde geneesmiddelen](#)'. Gelukkig komt deze bijwerking niet veel voor, maar voorkomen is altijd beter dan genezen!

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



#### Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

**Nee**, je mag een behandeling met perindopril niet zomaar zonder medisch advies stoppen. Het is belangrijk dat je bloeddruk onder controle blijft.



#### Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

##### Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis perindopril op het **volgende voorziene tijdstip**.

Neem **nooit een dubbele dosis** perindopril om een vergeten dosis in te halen.

### Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker** of bel het Antigifcentrum (070 245 245).

Je kan volgende klachten krijgen:

- duizeligheid;
- zwak voelen;
- lage bloeddruk;
- snelle of trage hartslag, hartkloppingen.



### Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

#### Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je perindopril gebruikt, **behalve** als je:

- je **duizelig** voelt;
- je **slaperig** voelt;
- problemen hebt met je **zicht**.

Enkel wanneer je deze **klachten niet hebt**, mag je **met de auto rijden of machines bedienen**, maar **blijf altijd voorzichtig**.

#### Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken als je perindopril gebruikt, maar met mate. Alcohol kan ervoor zorgen dat de bloeddruk nog meer daalt, waardoor de bloeddruk te laag kan worden.

#### Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je perindopril gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op perindopril.



### Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Gebruik **geen perindopril** als je zwanger bent.

Je kan perindopril gebruiken tijdens de borstvoeding.

#### Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

**Nee**, je mag perindopril niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Er is een risico op **schadelijke effecten op je baby**.

Het is wel belangrijk dat je **geen hoge bloeddruk hebt tijdens je zwangerschap**. Dus als je voor je zwangerschap perindopril gebruikte voor een te hoge bloeddruk, dan zal je arts je overschakelen op een ander geneesmiddel.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van perindopril met je **arts of je apotheker**.

#### Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag perindopril gebruiken **tijdens een periode van borstvoeding**.

**Bespreek dit met je arts of apotheker** als je borstvoeding geeft en perindopril moet gebruiken.



## Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Perindopril kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen/producten:

- andere geneesmiddelen bij een **hoge bloeddruk** zoals sommige **diuretica** (zogenaamde “plaspillen”);
- sommige **ontstekingsremmers** (bv. [ibuprofen](#));
- geneesmiddelen die veel **kalium** bevatten (kaliumsupplementen);
- **sartanen**, geneesmiddelen die helpen om de bloeddruk te verlagen en het hart te beschermen;
- **lithium**, een geneesmiddel bij manie of depressie;
- sommige geneesmiddelen tegen **suikerziekte** (diabetes mellitus) (bv. vildagliptine);
- sommige geneesmiddelen bij een **langdurige mindere werking van het hart** (hartfalen) (bv. sacubitril en [valsartan](#));
- **racecadotril**, een geneesmiddel bij diarree;
- sommige geneesmiddelen bij **kanker** of die het **immuunsysteem onderdrukken** (bv. everolimus, sirolimus en estramustine).

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: [‘Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?’](#). Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



## Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik perindopril niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- als je in het verleden al een **allergische reactie** (vochtophoping op verschillende plaatsen van je lichaam) hebt gehad na het gebruik van geneesmiddelen zoals perindopril;
- bij **levercirrose** (een ziekte waarbij je leverweefsel langzaam beschadigd raakt en littekens vormt);
- als je een **vernauwing of verstopping van de nierslagaders** hebt;
- bij een **te hoog kaliumgehalte** in het bloed (hyperkaliëmie);
- als je **veel vocht verloren** hebt (bijvoorbeeld als je meer dan 24 uur moet braken, diarree hebt of hoge koorts hebt): bespreek met je arts als je dosis tijdelijk moet worden verlaagd.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van perindopril, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: [‘Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?’](#). Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



## Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

### Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

