



### Belangrijk om te weten

- Gebruik meloxicam **zo kort mogelijk en in de laagst mogelijke dosis**.
- Drink best **geen alcohol** wanneer je meloxicam gebruikt.
- **Gebruik geen** meloxicam tijdens het **derde trimester van je zwangerschap**.
- Meloxicam is **niet geschikt** voor de verlichting van **gewone, lichte of tijdelijke pijn**.



### Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof meloxicam zijn **ontstekingsremmers**.

Je arts schrijft meloxicam voor bij **pijn en ontsteking**:

- een aanval van gewrichtsslijtage (artrose);
- gewrichtsreuma (reumatoïde artritis);
- de ziekte van Bechterew (spondyloartritis).



### Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die piroxicam bevatten. Je ziet er hoeveel piroxicam ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.



### Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

#### Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet gebruiken en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek met je arts, vraag dan best eerst **advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Piroxicam wordt voorgeschreven aan **volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar**.

Je mag **niet meer innemen dan 20 mg (milligram) per dag** (24 uur), tenzij je arts dit anders voorschrijft. Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

#### Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem meloxicam in **op gelijk welk moment** van de dag. Bij langdurig gebruik kies je best een **vast tijdstip**.

Neem meloxicam in **tijdens of net na de maaltijd**, zo heb je minder risico op maag- of darmklachten. Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten op welk tijdstip je meloxicam moet gebruiken.

### Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

**Bespreek met je arts** hoelang je meloxicam moet gebruiken.

Gebruik meloxicam **zo kort mogelijk**. Als de **klachten** van pijn en ontsteking **verdwenen** zijn, **stop** dan met het gebruik van meloxicam.

Heb je ondanks het gebruik van meloxicam na enkele dagen nog evenveel of zelfs meer last van klachten, neem dan contact op met **je arts**.

Bij een langdurig gebruik heb je ook een groter risico op **bijwerkingen**.

**Bespreek langdurig gebruik met je arts.**



### Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden:

- huiduitslag die steeds erger wordt, met blaar- of wondvorming;
- bloedingen;
- darmzweer of -perforatie die bloed in de stoelgang en buikpijn geeft;
- ontsteking van de lever (hepatitis), gele kleur van de ogen of huid (geelzucht).

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van piroxicam zijn de volgende:

#### Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, verstopping van de darmen (constipatie), buikpijn en maagproblemen;
- maagontsteking (gastritis), maagzweer, bloed overgeven of bloed in de stoelgang;
- verwondingen en zwellingen in de mond (stomatitis);
- verergering van colitis en de ziekte van Crohn;
- oorsuizen, duizeligheid, hoofdpijn.

Het gebruik van piroxicam kan je **huid gevoeliger maken voor zonlicht** en je huid kan sneller verbranden en blaren krijgen. **Bescherm daarom je huid tegen zonlicht**. Hoe je dit kan doen, kan je lezen in het thema '[Opgelet voor zonlicht bij bepaalde geneesmiddelen](#)'. Gelukkig komt deze bijwerking niet veel voor, maar voorkomen is altijd beter dan genezen!

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook [rechtstreeks melden aan het FAGG](#).



## Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Goed idee dat je wil stoppen. Ja, je kan in één keer stoppen met het gebruik van meloxicam. Als je symptomen verdwenen zijn, doe je dit **best zo snel mogelijk**.



## Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

### Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis piroxicam wanneer het je invalt, of pas op het **volgende voorziene tijdstip** als het hiervoor bijna tijd is.

Neem **nooit een dubbele dosis** piroxicam om een vergeten dosis in te halen.

### Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Je kan volgende klachten krijgen:

- spijsverteringsproblemen;
- duizeligheid;
- wazig zicht;
- coma.



## Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

### Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of een machine bedienen als je piroxicam gebruikt, **behalve** als je:

- **problemen hebt met je zicht** of een **wazig zicht hebt**;
- je **bedwelmd** voelt;
- je **slaperig** voelt;
- deze klachten al hebt ervaren met andere ontstekingsremmers.

Enkel wanneer je deze **klachten niet hebt**, mag je **met de auto rijden of machines bedienen**, maar **blijf altijd voorzichtig**.

### Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

**Nee**, je drinkt best geen alcohol als je piroxicam gebruikt.

**Alcohol versterkt de bijwerkingen** van meloxicam op je maag en darmen. Het risico op het krijgen van een bloeding in je maag of darmen, zal verhogen.

### Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je piroxicam gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op piroxicam.



## Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Gebruik geen piroxicam als je zwanger bent.

Piroxicam wordt afgeraden als je borstvoeding geeft.

### Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Nee, je mag piroxicam niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Er is een risico op **schadelijke effecten op je baby**.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van piroxicam met **je arts of je apotheker**.

### Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van piroxicam wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding**.

De arts kan beslissen om toch piroxicam voor te schrijven tijdens de borstvoeding en zal dit verder met jou goed opvolgen.

**Bespreek dit met je arts of apotheker** als je borstvoeding geeft en piroxicam moet gebruiken.



## Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Piroxicam kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- andere **ontstekingsremmers**, zoals **acetylsalicylzuur**;
- ontstekingsremmers zoals **cortisone** (corticoïden);
- sommige geneesmiddelen die het **vormen van bloedklonters tegengaan** (bloedverdunners);
- sommige geneesmiddelen bij **depressie**;
- sommige geneesmiddelen bij een **hoge bloeddruk**;
- sommige **diuretica** (zogenaamde “plaspillen”);
- **immunosuppressiva**, geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken;
- **lithium**, een geneesmiddel bij manie of depressie;
- **methotrexaat**, een geneesmiddel bij kanker, psoriasis of reuma;
- **colestyramine**, een geneesmiddel om vetten in het bloed te verminderen;
- **digoxine**, een geneesmiddel tegen hartfalen.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



## Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik piroxicam niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- als je **allergisch** bent voor andere **ontstekingsremmers** of **acetylsalicylzuur**;
- voor tabletten: bij **galactosemie** (een ernstige erfelijke ziekte waarbij je geen galactose verteert);
- voor bruistabletten: bij een zeldzame ziekte veroorzaakt door de ophoping van het aminozuur fenylalanine (**fenylketonurie**);
- bij een **mindere werking van de lever** (leverinsufficiëntie);

- bij een **mindere werking van de nieren** (nierinsufficiëntie);
- bij een **mindere werking van het hart** (hartinsufficiëntie);
- bij een (voorgeschiedenis van) **maagbloeding of darmbloeding**;
- bij een (voorgeschiedenis van) **maagzweer of darmzweer**;
- bij een voorgeschiedenis van **ernstige maag-darmziekten (bv. colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn, maag- of darmkankers of diverticulitis)**;
- bij een voorgeschiedenis van ernstige **allergische reacties op geneesmiddelen**.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van piroxicam, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



## Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

### Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Hou dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 - 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen in **je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

### Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na 'EXP'.

