

Rosuvastatin Sandoz 20 mg

Geneesmiddel

Prijs

€ 11,41

Terugbetaald

Onder voorwaarden

Remgeld

Variabel

Remgeld verhoogde terugbetaling

€ 1,00

Firma

Sandoz SA-NV

Aflevering

Medisch voorschrift

Verpakking

Blisterverpakking

De werkzame stof van Rosuvastatin Sandoz 20 mg is **Rosuvastatine**. Hier vind je alle informatie over de werking van Rosuvastatine.



Belangrijk om te weten

- Je kan last krijgen van **milde spierklachten** door rosuvastatine. In zeldzame gevallen kan er **spierafbraak** optreden, wat kan leiden tot **beschadiging van je nieren**: je hebt dan ernstige spierpijn en spierkrampen.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof **rosuvastatine** zijn **statines**. Een statine is een **cholesterolverlager**.

Statines zorgen voor:

- een **verlaging** van het **totale cholesterolgehalte** in je bloed;
- een **verlaging** van de '**slechte**' **cholesterol** in je bloed;
- een **verlaging** van vetachtige stoffen in het bloed (**triglyceriden**);
- een **lichte verhoging** van de '**goede**' **cholesterol** in je bloed.

Je arts schrijft rosuvastatine voor bij:

- een te hoog **cholesterolgehalte** in je bloed;
- een te hoog **vetgehalte** in je bloed;
- een **erfelijke aandoening** waardoor je **cholesterolgehalte** in je bloed **verhoogd** is;
- **aandoeningen** van het **hart** of **bloedvaten**;
- een hoog risico op aandoeningen van het hart en/of bloedvaten. Dit is onder andere het geval als je **suikerziekte** hebt, een **beroerte** of een andere aandoening van je **bloedvaten** hebt gehad.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die rosuvastatine bevatten. Je ziet er hoeveel rosuvastatine ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen die naast rosuvastatine nog andere werkzame stoffen bevatten. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een [nieuwe zoekopdracht](#) uit.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Je mag **niet meer innemen dan 40 mg (milligram) per dag** (24 uur). Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem rosuvastatine in op **gelijk welk moment** van de dag, **met of zonder voedsel**.

Je lichaam maakt vooral 's nachts cholesterol aan. Doordat rosuvastatine voldoende lang werkt, maakt het niet uit wanneer je dit geneesmiddel inneemt.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Het is mogelijk dat je rosuvastatine voor een **lange tijd** moet gebruiken. De arts kan je behandeling echter aanpassen als dat nodig is, en dat kan betekenen dat je andere geneesmiddelen krijgt.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden:

- spierpijn;
- gevoelige spieren;
- zwakte in je spieren;
- spierkrampen.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn de symptomen van spieraafbraak, wat kan leiden tot beschadiging van je nieren:

- hevige spierpijn;
- hevige spierkrampen;
- donkere urine;
- minder of niet meer plassen;
- verwardheid;
- verlies van bewustzijn;
- koorts.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want

dit zijn de symptomen van een ontsteking van je lever:

- gele kleur van de ogen of huid (geelzucht);
- donkere urine;
- bleke stoelgang;
- moe en zwak gevoel;
- hevige buikpijn.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van rosuvastatine zijn de volgende:

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- hoofdpijn;
- maagpijn;
- verstopping van de darmen (constipatie);
- spierpijn;
- duizeligheid;
- zich zwak voelen;
- een groter risico op het krijgen van suikerziekte.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- huiduitslag;
- jeuk;
- andere huidreacties.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Nee, je mag een behandeling met rosuvastatine niet zomaar zonder medisch advies stoppen. Je gehalte aan cholesterol of vetten in je bloed zou dan terug stijgen. Op lange termijn krijg je dan opnieuw een groter risico om aandoeningen van het hart of bloedvaten te ontwikkelen.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis rosuvastatine op het **volgende voorziene tijdstip**.

Neem **nooit een dubbele dosis** rosuvastatine om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Er zijn **geen symptomen** bekend van overdosering, maar je loopt een **hoger risico op spierafbraak**. Die spierafbraak kan uiteindelijk leiden tot **nierfalen**.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je rosuvastatine gebruikt.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken als je rosuvastatine gebruikt.

Je drinkt wel beter met mate. Alcohol kan namelijk het **risico op spierafbraak vergroten**.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je rosuvastatine gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op rosuvastatine.

Een **gezonde levensstijl** is belangrijk als je een hoge cholesterol hebt, te veel vetten in je bloed hebt of hart- en vaatziekten hebt. Bij vragen hierover, aarzel niet om een diëtist te contacteren



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Rosuvastatine wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Het gebruik van rosuvastatine wordt **afgeraden tijdens de zwangerschap**.

Over het gebruik van rosuvastatine tijdens de zwangerschap is **onvoldoende bekend** om zeker te zijn dat het veilig is. Je arts zal de ernst van je symptomen afwegen tegen het risico voor je kind.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van rosuvastatine met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van rosuvastatine wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding** omdat niet bekend is of rosuvastatine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Je arts zal de ernst van je symptomen afwegen tegen het risico voor je kind.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en rosuvastatine moet gebruiken.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Rosuvastatine kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen/producten:

- **ciclosporine**, een geneesmiddel bij orgaantransplantatie;
- **colchicine**, een geneesmiddel bij jicht;
- sommige **macroliden antibiotica** (bv. azithromycine, clarithromycine);
- andere geneesmiddelen bij **veel cholesterol en vetten in het bloed**;
- sommige **bloedverdunners**;

- bepaalde geneesmiddelen kunnen de manier waarop rosuvastatine door de lever wordt **afgebroken beïnvloeden**. Dit kan de **werkzaamheid veranderen** of het risico op **bijwerkingen verhogen**. Onder deze geneesmiddelen vallen onder andere:
 - sommige geneesmiddelen bij epilepsie;
 - sommige antibiotica;
 - sommige geneesmiddelen bij schimmelinfecties.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik rosuvastatine niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij een **mindere werking van de lever** (leverinsufficiëntie);
- bij een **mindere werking van de nieren** (nierinsufficiëntie);
- als je **veel alcohol drinkt** of een **alcoholverslaving** hebt.

Patiënten met een **hoog suikergehalte in het bloed** en **overgewicht** lopen een licht verhoogd risico op het ontwikkelen van **suikerziekte** door het gebruik van rosuvastatine en moeten hiervoor **nauwkeurig opgevolgd** worden.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van rosuvastatine, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

Sommige tabletten bevinden zich in een **fles** (container), en deze zijn maar **beperkt houdbaar na opening**, bekijk hiervoor de bijsluiter.



Noteer hier al je vragen voor je arts, apotheker of andere zorgverlener.

FarmaInfo

een initiatief van het fagg[®]

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?

Neem contact op met je arts of apotheker.