

Ventolin 1 mg/ml

Geneesmiddel

Prijs

-

Terugbetaald

-

Firma

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
SA-NV

Aflevering

Medisch voorschrift

Verpakking

Ampul

De werkzame stof van Ventolin 1 mg/ml is **Salbutamol**. Hier vind je alle informatie over de werking van Salbutamol.



Belangrijk om te weten

- Volg **altijd de instructies** van je apotheker voor het **correct inhaleren** van salbutamol. Een [goede inhalatietechniek](#) zorgt voor een betere werking van het geneesmiddel.
- Als je **meer of vaker salbutamol** moet gebruiken dan normaal, **contacteer dan je arts**. Je behandeling moet dan misschien worden aangepast.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof salbutamol zijn **geneesmiddelen die de luchtwegen verwijden**.

Je arts schrijft salbutamol voor bij **astma** of **chronische bronchitis (COPD)**.

COPD is een ziekte die wordt gekenmerkt door een langdurige vernauwing van de kleine luchtwegen, wat leidt tot ademnood, hoesten en slijmen.

Astma is een aandoening van de luchtwegen waarbij je vaak periodes hebt van ademhalingsmoeilijkheden, hoesten en een piepende ademhaling.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](#).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die salbutamol bevatten. Je ziet er de dosering van het geneesmiddel, in welke vormen het kan worden toegediend, de bijsluiter, de prijs van het geneesmiddel en de vergoedingsmodaliteiten, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen die naast salbutamol nog andere werkzame stoffen bevatten. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een [nieuwe zoekopdracht](#) uit.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang? Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet gebruiken en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek met je arts, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

- Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
 - Aerosoldruppels: je mag **niet meer dan 2,5 à 5 mg (milligram) (= 0,5 à 1 ml (milliliter)) gebruiken, tot viermaal per dag (24 uur)**.
 - Flacon onder druk (puffer): je mag **niet meer gebruiken dan 8 inhalaties per dag (24 uur)**.
- Kinderen < 12 jaar:
 - Aerosoldruppels: je mag **niet meer dan 2,5 à 5 mg (0,5 à 1 ml) gebruiken, tot viermaal per dag (24 uur)**.
 - Flacon onder druk (puffer): je mag **niet meer gebruiken dan 8 inhalaties per dag (24 uur)**. Bij kinderen is het soms beter om een voorzetkamer te gebruiken.

Volg altijd de **instructies** van je **apotheker** voor het **correct inhaleren** van salbutamol. Een [goede inhalatietechniek](#) zorgt voor een betere werking van het geneesmiddel.

Je apotheker kan je een begeleidingsgesprek voor een "Goed Gebruik van Geneesmiddelen" (GGG) aanbieden. De apotheker zal samen met jou nagaan of je je inhalatoren correct gebruikt. Het GGG is gratis voor [astmapatiënten](#) en [COPD-patiënten](#).

Als je **meer of vaker salbutamol** moet gebruiken dan normaal, **contacteer dan je arts**. Je behandeling moet dan misschien worden aangepast.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Gebruik salbutamol op **gelijk welk moment** van de dag, **met of zonder voedsel**. Bij langdurig gebruik kies je best een **vast tijdstip**.

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten hoeveel keer per dag je salbutamol moet gebruiken.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Besprek met je arts hoelang je salbutamol moet gebruiken.

Het is mogelijk dat je salbutamol voor een **lange tijd** moet gebruiken. De arts kan je behandeling echter aanpassen als dat nodig is, en dat kan betekenen dat je andere geneesmiddelen krijgt.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Een [goede inhalatietechniek](#) zorgt voor minder bijwerkingen.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn de symptomen van een ernstige allergische reactie:

- uitslag of roodheid van je huid;
- zwelling van je gezicht of je mond;
- piepende ademhaling of ademhalingsmoeilijkheden;
- je plots zwak voelen;
- duizeligheid, je licht voelen in je hoofd.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van salbutamol zijn de volgende:

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- hartkloppingen;
- irritatie van mond en keel;
- hoofdpijn;
- beven;
- rusteloosheid, niet kunnen slapen;
- spierkrampen.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- weinig kalium in het bloed (hypokaliëmie);
- snelle hartslag;
- hoesten;
- verwijding van de bloedvaten in de vingers en voeten.

zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Nee, je mag een behandeling met salbutamol niet zomaar zonder medisch advies stoppen. Als je stopt met het gebruik van salbutamol kunnen de klachten en symptomen van je COPD of astma erger worden.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis salbutamol wanneer het je invalt, of pas op het **volgende voorziene tijdstip** als het hiervoor bijna tijd is.

Gebruik **nooit een dubbele dosis** salbutamol om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Je kan volgende klachten krijgen:

- rusteloosheid;
- lage bloeddruk;
- snelle of trage hartslag;
- beven.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je salbutamol gebruikt.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken als je salbutamol gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van alcohol op salbutamol.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je salbutamol gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op salbutamol.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Salbutamol is veilig voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Ja, je mag salbutamol gebruiken tijdens de zwangerschap. Er zijn **geen negatieve effecten bekend**.

Als je astma hebt, is het belangrijk voor jou en je baby om je behandeling gewoon te blijven volgen. Tijdens je zwangerschap moeten symptomen van astma goed onder controle zijn.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Besprek** dan het gebruik van salbutamol met **je arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag salbutamol gebruiken als je borstvoeding geeft. Er zijn **geen negatieve effecten bekend**.

Besprek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en salbutamol moet gebruiken.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Salbutamol kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- sommige geneesmiddelen bij **hartproblemen** (bètablokkers);
- sommige **diuretica** (zogenaamde “plaspillen”);
- sommige geneesmiddelen met **cortisone**;
- **theofylline**, een geneesmiddel bij COPD of astma.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: [‘Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?’](#). Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Er zijn geen gezondheidssituaties bekend waarbij je salbutamol niet mag gebruiken.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van salbutamol, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: [‘Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?’](#). Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hou dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen.**

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 - 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na “EXP”.

Na opening zijn de **druppels 1 maand** houdbaar.



Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een
initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?

Neem contact op met je arts of apotheker.