



Belangrijk om te weten

- Je kan last krijgen van een droge mond door solifenacine. Zorg voor een goede mondhygiëne.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof solifenacine zijn **anticholinergica**.

Je arts schrijft solifenacine voor bij **een overactieve blaas** of **klachten van een overactieve blaas** zoals:

- vaker dan normaal plassen;
- het gevoel hebben dat je vaak moet plassen;
- ongewild verliezen van urine (urine-incontinentie).

Je arts schrijft solifenacine voor aan kinderen bij een **aandoening met onwillekeurige contracties van de blaas (neurogene detrusoroveractiviteit)**.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die solifenacine bevatten. Je ziet er hoeveel solifenacine ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen die naast solifenacine nog andere werkzame stoffen bevatten. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een [nieuwe zoekopdracht](#) uit.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen. Op dat etiket kan je lezen **wat de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Solifenacine wordt voorgeschreven aan **volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar**.

Je mag **niet meer innemen dan 10 mg (milligram) per dag** (24 uur). Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

De dosis voor kinderen hangt van het lichaamsgewicht. Je arts zal de correcte dosis bepalen.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Tablet: neem solifenacine in **met of zonder voedsel**.

Siroop: neem solifenacine in **zonder voedsel**.

Bij langdurig gebruik kies je best een **vast tijdstip**.

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten op welk tijdstip je solifenacine moet innemen.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Besprek met je arts hoelang je solifenacine moet gebruiken.

Het is mogelijk dat je solifenacine voor een lange tijd of zelfs levenslang moet gebruiken. De arts kan je behandeling echter aanpassen als dat nodig is, en dat kan betekenen dat je andere geneesmiddelen krijgt.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn de symptomen van een allergische reactie:

- zwelling van je lippen, tong en huid;
- ademhalingsmoeilijkheden;
- slikproblemen;
- blaren op de huid, vervellen van de huid;
- zwelling van de huid.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van solifenacine zijn de volgende:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 mensen)

- droge mond.

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- misselijkheid;
- maagproblemen (dyspepsie), verstopping van de darmen (constipatie), buikpijn;
- wazig zicht.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- droge ogen, neus, keel en huid;
- terugkomen van de maaginhoud in de slokdarm en soms in de keel (gastro-oesofageale reflux);
- vermoeidheid, slaperigheid;
- smaakproblemen;
- vochtophoping in de ledematen (oedeem);
- problemen met plassen, infectie van de urinewegen.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Ja, je kan in één keer stoppen met het gebruik van solifenacine.

Je klachten van een overactieve blaas kunnen terugkeren. Bespreek dit met je arts of apotheker.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis solifenacine wanneer het je invalt, of pas op het **volgende voorziene tijdstip** als het hiervoor bijna tijd is.

Neem **nooit een dubbele dosis** solifenacine om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Je kan volgende klachten krijgen:

- hoofdpijn, duizeligheid;
- droge mond;
- slaperigheid;
- wazig zicht, verwijding van je pupillen;
- dingen zien, horen en voelen die er niet zijn (hallucinaties);
- opwindingen;
- epilepsie aanvallen (convulsies);
- problemen met ademen;
- snelle hartslag;
- je blaas niet (volledig) kunnen ledigen bij het plassen.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je solifenacine gebruikt, **behalve** als je:

- je **slaperig** voelt;
- een **wazig of dubbel** zicht hebt.

Enkel wanneer je deze **klachten niet hebt**, mag je een **voertuig besturen of machines bedienen**, maar **blijf altijd voorzichtig**.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken als je solifenacine gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van alcohol op solifenacine.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je mag niet alles eten als je solifenacine gebruikt.

Je mag **geen pompelmoes of ander aanverwant citrusfruit** (zoals pomelo) eten. Ook **bereidingen op basis van deze vruchten** moet je vermijden.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Solifenacine wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Over het gebruik van solifenacine tijdens de zwangerschap is **onvoldoende bekend** om zeker te zijn dat het veilig is. Je arts zal de ernst van je symptomen afwegen tegen het risico voor je kind.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van solifenacine met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van solifenacine wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding** omdat niet bekend is of solifenacine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Je arts zal de ernst van je symptomen afwegen tegen het risico voor je kind.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en solifenacine moet gebruiken.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Solifenacine kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen/producten:

- andere geneesmiddelen met een **anticholinerge werking** (bv. verdovende middelen en geneesmiddelen bij psychische ziekten en depressie);
- **metoclopramide**, een geneesmiddel tegen braken en misselijkheid;
- geneesmiddelen tegen **osteoporose** (bisfosfonaten);
- sommige geneesmiddelen met een **cholinerge werking** (bv. pilocarpine).
- bepaalde geneesmiddelen kunnen de manier waarop solifenacine door de lever wordt afgebroken **beïnvloeden**. Dit kan de **werkzaamheid veranderen** of het risico op **bijwerkingen verhogen**. Onder deze geneesmiddelen vallen onder andere:
 - sommige antibiotica;
 - sommige geneesmiddelen bij een schimmelinfectie;
 - sommige geneesmiddelen tegen aids;
 - sommige geneesmiddelen bij kanker;
 - sommige geneesmiddelen bij epilepsie;
 - sommige geneesmiddelen bij taaislijmziekte;
 - sint-janskruid (een kruid gebruikt bij depressie).

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik solifenacine niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- als je je **blaas niet (volledig) kan ledigen** bij het plassen;
- als je een **ernstige aandoening** van de **maag of darmen** hebt;
- bij bepaalde **aandoeningen van spierzwakte** (myasthenia gravis);
- als je **staar** (glaucoom) hebt;
- bij een **mindere werking van de lever** (leverinsufficiëntie);
- als je **nierdialyse** ondergaat.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van solifenacine, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

