



Belangrijk om te weten

- Als je vakantieplannen hebt naar landen waar gele koorts voorkomt, bv. sommige landen in **Afrika** of **Latijns-Amerika**, is het **aangeraden** om je te laten vaccineren tegen gele koorts. In sommige landen is een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts **verplicht**. Bespreek de noodzaak van vaccinatie met je arts of apotheker. Als je meer informatie wilt over de vaccinaties die nodig zijn voor je op reis gaat, lees dan dit [thema](#) of raadpleeg [Wanda.be](#).
- Er zijn **officiële aanbevelingen** omtrent vaccinatie tegen gele koorts. Je kan hierover altijd advies vragen aan je arts of apotheker.



Meer informatie over reisvaccinaties, lees je in [dit thema](#).

Heb je vragen over vaccins? Wil je graag over vaccins praten? Neem een kijkje in [dit thema](#) voor de praatkaarten over vaccinatie.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Een vaccin tegen gele koorts helpt je te **beschermen tegen gele koorts**, een ziekte die wordt veroorzaakt door een beet van een mug die besmet is met het gelekoorts virus.

De meeste personen krijgen geen symptomen door een infectie met het gele koorts virus, maar soms kan een levensbedreigende ziekte optreden: gele verkleuring van de ogen of huid (geelzucht), koorts en ernstige bloedingen.

Na een vaccinatie, maakt je **eigen afweersysteem** een **bescherming** tegen de ziekte.

Het vaccin zelf kan geen gele koorts veroorzaken.

Vaccinatie tegen gele koorts is aangeraden bij reizen naar landen waar gele koorts voorkomt, bv. sommige landen in Afrika en Zuid-Amerika. In sommige landen is een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts verplicht om toegang te krijgen tot het land. Het certificaat van vaccinatie tegen gele koorts is levenslang geldig. **Bespreek de noodzaak voor vaccinatie met je arts.**

Bij bepaalde personen zal een arts de voordelen en risico's van vaccinatie tegen gele koorts grondig afwegen (bv. bij kinderen tussen 6 en 9 maanden, bij reizigers ouder dan 60 jaar, bij zwangere vrouwen en bij vrouwen die borstvoeding geven). Bij personen met een verminderde afweer mag het vaccin tegen gele koorts niet gegeven worden.

Bij gezonde personen vanaf de leeftijd van 2 jaar beschermt één inenting met het vaccin levenslang tegen gele koorts. Bij bepaalde personen is een éénmalige hervaccinatie aanbevolen. Meer uitleg vindt je in de rubriek: "[Wat is het vaccinatieschema?](#)".

Voor meer informatie kan je terecht bij je arts of apotheker en op [Wanda.be](#).



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmalInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht van de gele koorts vaccins vind je bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

Neem de bijsluiter door wanneer je informatie zoekt over een specifiek vaccin (samenstelling, informatie over allergieën ...).



Wat is het vaccinatieschema en wanneer krijg ik dit vaccin?

Wat is het vaccinatieschema?

Een vaccinatie tegen gele koorts kan worden gegeven vanaf de leeftijd van 9 maanden, zeer uitzonderlijk vanaf de leeftijd van 6 maanden.

Gezonde personen vanaf de leeftijd van 2 jaar krijgen 1 inenting.

Na de eerste inenting wordt bij bepaalde personen een **eenmalige herhalingsinenting** aanbevolen bij een volgende reis naar een land waar gele koorts voorkomt. Dit is het geval bij volgende personen:

- kinderen die vóór de leeftijd van 2 jaar hun eerste inenting tegen gele koorts kregen;
- mensen met HIV;
- bepaalde personen waarbij het immuunsysteem onvoldoende werkt;
- vrouwen die tijdens de zwangerschap gevaccineerd werden.

Behoor jij tot één van deze groepen? Bespreek de nood voor een herhalingsinenting dan met je arts.

Het vaccin moet **minimum tien dagen voor aankomst** op de vakantiebestemming gegeven worden. Een vaccinatie tegen gele koorts mag enkel gebeuren door artsen die verbonden zijn aan [erkende centra](#).

Wanneer krijg ik dit vaccin?

Als je op reis gaat naar landen waar gele koorts voorkomt, bijvoorbeeld sommige landen in **Afrika of Latijns-Amerika**, of naar landen waar een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts verplicht is, bespreek dan tijdig met je arts of de vaccinatie tegen gele koorts nodig is.

Voor laboratoriumpersoneel dat werkt met gele-koortsvirus-stalen kan vaccinatie tegen gele koorts aanbevolen zijn. Bespreek dit met je arts.

Bespreek met je arts wanneer je je vaccin(s) best krijgt.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen na toediening van een vaccin tegen gele koorts zijn de volgende:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 mensen)

- pijn of gevoeligheid op de plaats van de inenting;
- hoofdpijn;

- sufheid;
- prikkelbaarheid;
- verlies van eetlust en huilen bij kinderen;
- braken;
- spierpijn;
- koorts.

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- roodheid, zwelling, bloeding of verharding op de plaats van de inenting;
- misselijkheid;
- gewrichtspijn;
- huiduitslag.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- zweren op de plaats van de inenting;
- buikpijn;
- duizeligheid;
- jeuk.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen na een vaccinatie tegen gele koorts.

Je kan na de vaccinatie last hebben van duizeligheid en sufheid maar dit zal **zelden je rijvaardigheid beïnvloeden**.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken na je vaccinatie.

Er is **geen bekend effect** van alcohol op een vaccinatie tegen gele koorts.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten na je vaccinatie.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op een vaccinatie tegen gele koorts.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Vaccinatie tegen gele koorts wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Je laten vaccineren tegen gele koorts wordt **afgeraden tijdens de zwangerschap**, tenzij het uiterst noodzakelijk is. Dit betekent dat een infectie met gele koorts een duidelijk risico moet inhouden voor de moeder en het kind.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het plaatsen van een vaccin tegen gele koorts met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Je laten vaccineren tegen gele koorts wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding**. Indien je toch een vaccinatie tegen gele koorts wenst, moet je de borstvoeding gedurende 2 weken na de vaccinatie stoppen.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en je een vaccinatie tegen gele koorts wenst.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Een vaccin tegen gele koorts kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- sommige geneesmiddelen die het **immuunsysteem onderdrukken**;
- het **bof-mazelen-rubella-vaccin**.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Laat je niet vaccineren tegen gele koorts in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- als je een **verminderd immuunsysteem** hebt;
- als je **allergisch bent voor eieren of kippeneiwitten**;
- als je een **ernstige allergische reactie** hebt gehad op een gele koorts vaccin in het verleden;
- als je tekenen hebt van een **HIV-infectie**;
- als je **schildklier verwijderd** is;
- als je een **probleem met je schildklier** hebt;
- als je de **spierziekte myasthenia gravis** hebt;
- als je **ziek bent en koorts** hebt.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

