



Belangrijk om te weten

- Een vaccin tegen kinkhoest is enkel beschikbaar als een **gecombineerd vaccin**. Dit wil zeggen dat deze vaccins je beschermen tegen **meerdere ziektes**.
- Een vaccinatie tegen kinkhoest is opgenomen in het **basisvaccinatieschema** bij baby's en jonge kinderen.
- **Zwangere vrouwen** worden aangeraden om zich te laten vaccineren tegen kinkhoest. Zo worden de **baby's beschermd** tegen kinkhoest in hun eerste levensmaanden.
- Er zijn **officiële aanbevelingen** omtrent vaccinatie tegen kinkhoest. Je kan hierover altijd advies vragen aan je arts of apotheker.



Kinkhoest is een zeer **besmettelijke infectie** van de **onderste luchtwegen**. Vooral **baby's en jonge kinderen** kunnen **erg ziek** worden door kinkhoest. Je kan meer informatie vinden over deze bacterie in het [thema rond kinkhoest](#).

Het vaccin tegen kinkhoest is opgenomen in het basisvaccinatieschema. Meer informatie hierover lees je in [dit thema](#).

Heb je vragen over vaccins? Wil je graag over vaccins praten? Neem een kijkje in [dit thema](#) voor de praatkaarten over vaccinatie.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Kinkhoest is een zeer **besmettelijke infectie** van de **onderste luchtwegen** die veroorzaakt wordt door een bacterie. Vooral **baby's en jonge kinderen** kunnen **erg ziek** worden door kinkhoest. Daarom worden de volgende groepen aangeraden om zich te laten vaccineren tegen kinkhoest:

- **zwangere vrouwen** als ze tussen 24 en 32 weken zwanger zijn: de pasgeboren baby's krijgen zo een bescherming mee via hun moeder;
- **baby's en jonge kinderen**: vaccinatie tegen kinkhoest is opgenomen in het basisvaccinatieschema;
- **volwassenen die veel in contact komen met kleine kinderen** zoals partners, grootouders en medewerkers in de kinderopvang (dit noemen we een 'cocoonavaccinatie'). Deze vaccinatie heeft echter geen zin als de moeder tijdens de zwangerschap is gevaccineerd: het kind is zo al beschermd tegen kinkhoest. Moeders die niet zijn gevaccineerd tijdens de zwangerschap, kunnen na de bevalling worden gevaccineerd, ook als ze borstvoeding geven. Vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap geeft altijd de beste bescherming voor het kind in de eerste levensmaanden.

Er zijn **officiële aanbevelingen** omtrent vaccinatie tegen kinkhoest. Je kan hierover altijd advies vragen aan je arts of apotheker.

Na een vaccinatie, maakt je **eigen afweersysteem** een **bescherming** tegen kinkhoest. Zwangere vrouwen geven deze bescherming door naar hun ongeboren baby **via de placenta**.

Zoals alle vaccins, kan ook dit vaccin **geen volledige bescherming** bieden aan iedereen die ingeënt is. De ziekte verloopt dan wel **veel minder ernstig**.

Je hebt door een vaccinatie tegen kinkhoest **geen levenslange bescherming** waardoor het noodzakelijk

is om je opnieuw te laten **vaccineren** als dit nodig is. Dit is het geval bij vrouwen bij elke zwangerschap, en eventueel ook bij de 'cocoonvaccinatie'.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmalInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

Neem de bijsluiter door wanneer je informatie zoekt over een specifiek vaccin (samenstelling, informatie over allergieën ...).



Wat is het vaccinatieschema en wanneer krijg ik dit vaccin?

Wat is het vaccinatieschema?

Baby's en kinderen: De vaccinatie tegen kinkhoest is opgenomen in het **basisvaccinatieschema** bij baby's en jonge kinderen. Ze krijgen een vaccin tegen kinkhoest als ze 8 weken oud zijn, 12 weken, 16 weken en 13 à 15 maanden.

Kinderen krijgen dan een **herhalingsvaccin** op de leeftijd van 5 à 6 jaar en op de leeftijd van 15 à 16 jaar.

Volwassenen: personen die veel aanwezig zijn bij jonge kinderen, worden aangeraden zich te laten vaccineren tegen kinkhoest. **Herhalingsvaccinaties** zijn aangewezen indien nodig.

Zwangere vrouwen: het wordt aanbevolen om je te laten vaccineren tussen week 24 en 32 van je zwangerschap. Dit moet dan **herhaald** worden bij een **nieuwe zwangerschap**.

Wanneer krijg ik dit vaccin?

Baby's en kinderen: zij krijgen een vaccin tegen kinkhoest op de leeftijd van:

- 8 weken;
- 12 weken;
- 16 weken;
- 13 à 15 maanden;
- 5 à 6 jaar.

Adolescenten: zij krijgen een vaccin tegen kinkhoest op de leeftijd van 15 à 16 jaar.

Volwassenen: bespreek met je arts of een vaccinatie of een herhaalvaccinatie nodig is.

Zwangere vrouwen: zij krijgen een vaccin tussen week 24 en 32 van de zwangerschap. Dit moet dan herhaald worden bij een nieuwe zwangerschap.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van een gecombineerd vaccin tegen kinkhoest zijn de volgende:

- pijn, zwelling en roodheid op de injectieplaats (dit kan enkele dagen aanhouden);
- hoofdpijn;
- vermoeidheid;
- je algemeen niet zo goed voelen;
- slaperigheid en prikkelbaarheid;
- harde plek op de injectieplaats;
- koorts;
- misselijkheid, buikpijn en braken;
- diarree;
- minder eetlust;
- spierpijn en gewrichtspijn;
- duizeligheid;
- opzwellen van je lymfeklieren;
- griepachtige symptomen;
- hoesten, infectie van de bovenste luchtwegen;
- jeuk en huiduitslag;
- heel veel zweten.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiters van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiters vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiters staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen na een vaccinatie tegen kinkhoest.

Je kan na de vaccinatie last hebben van **duizeligheid, vermoeidheid of hoofdpijn**, maar dit zal **zelden je rijvaardigheid beïnvloeden**.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken na je vaccinatie.

Er is **geen bekend effect van alcohol** op een vaccinatie tegen kinkhoest.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten na je vaccinatie.

Er zijn **geen bekende effecten** van bepaalde voedingswaren op het plaatsen van een vaccin tegen kinkhoest.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Een vaccinatie tegen kinkhoest wordt aangeraden voor zwangere vrouwen.

Een vaccinatie tegen kinkhoest is veilig voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Ja, je mag je laten vaccineren tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap.

De vaccinatie wordt sterk aangeraden bij zwangere vrouwen. Door je te laten vaccineren tussen de 24 en 32 weken van je zwangerschap, zorg je ervoor dat je baby een eerste bescherming tegen kinkhoest meekrijgt.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan de vaccinatie tegen kinkhoest met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag je laten vaccineren tegen kinkhoest terwijl je borstvoeding geeft. Als je nog niet gevaccineerd werd tijdens de zwangerschap, kan je gevaccineerd worden na de bevalling, ook als je borstvoeding geeft.

Bespreek met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft of een vaccinatie tegen kinkhoest nodig is.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Een vaccin tegen kinkhoest kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- geneesmiddelen die de **immuniteit onderdrukken**;
- het **vaccin tegen RSV**: hier wordt aanbevolen om **minstens twee weken te wachten**;
- een **ander vaccin**: vaccins mogen gelijktijdig worden toegediend, maar op een verschillende injectieplaats.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Laat je niet vaccineren tegen kinkhoest of overleg met je arts of apotheker in de volgende situaties:

- **ernstige allergische reacties** op een vaccinatie tegen kinkhoest in het verleden;
- als je op het moment van de vaccinatie **ziek** bent en **koorts** hebt. Stel de vaccinatie uit tot je volledig genezen bent.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Bewaar dit geneesmiddel **in de koelkast** (2 – 8°C). Leg het vaccin nooit in de diepvries.

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

