

Vaccin tegen pneumokokken voor kinderen

Werkzame stof

Belangrijk om te weten

- Vaccinatie tegen pneumokokken is opgenomen in het **basisvaccinatieschema** bij baby's en jonge kinderen.
- Een pneumokokkenvaccinatie beschermt je kind tegen een **besmetting door de meest voorkomende typen pneumokokken**. De bescherming is **nooit volledig**.
- Er zijn **officiële aanbevelingen** omtrent pneumokokkenvaccinatie. Je kan hiervoor altijd advies vragen aan je arts of apotheker.

Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Een pneumokokkenvaccin helpt je kind te **beschermen tegen ziekten**, en de **ernstige gevolgen** ervan, veroorzaakt door **pneumokokken bacteriën**.

Je kind laten **vaccineren tegen pneumokokken** is belangrijk, vooral als je kind een groot **risico** loopt om **ernstig ziek** te worden door een besmetting met pneumokokken (bv. kinderen met verminderde weerstand). Door pneumokokken kan je kind een ontsteking krijgen van het middenoor, de sinussen of de longen. De bacterie kan ook in de bloedbaan komen en een bloedvergiftiging veroorzaken. Als je kind al een andere aandoening heeft, zoals bijvoorbeeld een langdurige longziekte, dan kan je kind sneller en ernstiger ziek worden door een besmetting met pneumokokken.

Na een vaccinatie, maakt het **afweersysteem van je kind** een **bescherming** tegen de ziekte. Zo zal je kind enkele weken na de vaccinatie tegen pneumokokken, beschermd zijn tegen de types van bacteriën die in het vaccin zitten. Het vaccin beschermt je kind **niet tegen longontstekingen of een andere ziekte veroorzaakt door andere bacteriën dan pneumokokken**. Ook tegen ziekte door pneumokokken bacteriën is de **bescherming door de vaccinatie nooit volledig**. Het blijft dus erg belangrijk om **algemene hygiënische maatregelen** te nemen, zowel bij jezelf als bij je kind:

- was regelmatig de handen met zeep;
- hoest of nies in de elleboog;
- blijf thuis als jij of je kind zich ziek voelt;
- houd afstand van zieke personen.

Het vaccin zelf kan geen besmetting met pneumokokken veroorzaken.

Een pneumokokkenvaccin moet gebruikt worden volgens de **officiële aanbevelingen**. Je kan hierover altijd **advies vragen aan je arts of apotheker**.

Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmaInfo.be).

Niet alle vormen zijn geschikt voor je kind.

Bespreek met je arts of apotheker welk vaccin het meest geschikt is voor je kind.

In dit overzicht van de pneumokokkenvaccins vind je de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

Neem de bijsluiter door wanneer je informatie zoekt over een specifiek vaccin (samenstelling, informatie over allergieën ...).

Wat is het vaccinatieschema en wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?

Wat is het vaccinatieschema?

Een vaccinatie tegen pneumokokken wordt gegeven aan **baby's en kinderen**, maar kan ook worden gegeven aan **volwassenen**. Lees hiervoor de fiche '[Vaccin tegen pneumokokken](#)'.

Er bestaan verschillende vaccins tegen pneumokokken:

- **PPV23:** dit vaccin werkt tegen 23 types pneumokokken bacteriën;
- **PCV13:** dit vaccin werkt tegen 13 types pneumokokken bacteriën;
- **PCV15:** dit vaccin werkt tegen 15 types pneumokokken bacteriën;
- **PCV20:** dit vaccin werkt tegen 20 types pneumokokken bacteriën.

Deze vaccins kunnen gecombineerd worden in een vaccinatieschema om tot de beste bescherming te komen.

Voor de basisvaccinatie van baby's en kinderen bieden de gezondheidsinstanties in Vlaanderen en de Federatie Wallonië-Brussel een pneumokokkenvaccin gratis aan. De keuze van het vaccin gebeurt op basis van het advies van de officiële aanbevelingen in België. Op dit ogenblik wordt PCV13 gratis aangeboden (situatie op 28/10/2024).

Pneumokokkenvaccinatie maakt deel uit van het basisvaccinatieschema voor kinderen. Kinderen krijgen 3 inenting tegen pneumokokken: op de leeftijd van 8 weken, 16 weken en 12 maanden.

Let op:

- **vroeggeboren kinderen** krijgen 4 inenting tegen pneumokokken (op de leeftijd van 8 weken, 12 weken, 16 weken en 12 maanden);
- **kinderen met verhoogd risico op een ernstige pneumokokkeninfectie** door een onderliggende ziekte (bv. kinderen met een langdurige longziekte of kinderen met slechter werkend immuunsysteem) krijgen een aangepast schema. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je arts of apotheker.

Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?

Baby's en kinderen krijgen via het basisvaccinatieschema een vaccin tegen pneumokokken op de leeftijd van:

- 8 weken;
- 16 weken;
- 12 maanden.

Kinderen die te vroeg geboren zijn krijgen via het basisvaccinatieschema een vaccin tegen pneumokokken op de leeftijd van:

- 8 weken;
- 12 weken;
- 16 weken;
- 12 maanden.

Kinderen met verhoogd risico op een ernstige pneumokokkeninfectie door een onderliggende ziekte (bv. kinderen met een langdurige longziekte of kinderen met slechter werkend immuunsysteem) krijgen een aangepast schema. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je arts of apotheker.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van een pneumokokkenvaccin zijn de volgende:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 mensen)

- lokale reacties op de plaats van injectie (roodheid, zwelling, verharding, gevoeligheid, pijn);
- koorts;
- verminderde eetlust;
- prikkelbaarheid;
- slaperigheid en slecht slapen.

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- pijn op de plaats van injectie waardoor ze minder goed kunnen bewegen;
- een blauwe plek op de plaats van injectie;
- hoge koorts;
- hoofdpijn;
- braken en diarree.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- netelroos (urticaria);
- huilen.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).

Mag mijn kind alles eten en drinken als het dit geneesmiddel gebruikt?

Ja, je kind mag alles eten na de vaccinatie.

Er zijn **geen bekende effecten** van bepaalde voedingswaren op het plaatsen van een pneumokokkenvaccinatie.

Waarop moet ik letten als mijn kind nog andere geneesmiddelen gebruikt?

Een pneumokokkenvaccin kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je kind dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- een **ander vaccin**: vaccins mogen gelijktijdig worden toegediend, maar op een verschillende injectieplaats.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Waarop moet ik letten als mijn kind nog andere gezondheidsproblemen heeft?

Laat je kind niet vaccineren tegen pneumokokken of overleg met je arts of apotheker in de volgende situaties:

- **ernstige allergische reacties** op een pneumokokken vaccinatie in het verleden.
- als je kind op het moment van de vaccinatie **ernstig ziek** is en **hoge koorts** heeft. Stel de vaccinatie uit tot je kind volledig genezen is.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van griepvaccinatie, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Bewaar dit geneesmiddel **in de koelkast** (2 – 8°C). Leg het vaccin nooit in de diepvries.

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**.

Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem contact op met je arts of apotheker.