



Belangrijk om te weten

- Een pneumokokkenvaccinatie wordt **aangeraden** door Belgische gezondheidsinstanties **voor volwassenen van 65 tot 85 jaar**, mensen die **langdurig ziek** zijn of een **verminderde weerstand** hebben.
- Er zijn **officiële aanbevelingen** omtrent pneumokokkenvaccinatie. Je kan hiervoor altijd advies vragen aan je arts of apotheker.



Heb je vragen over vaccins? Wil je graag over vaccins praten? Neem een kijkje in [dit thema](#) voor de praatkaarten over vaccinatie.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Een pneumokokkenvaccin helpt je te **beschermen tegen ziekten**, en de **ernstige gevolgen** ervan, veroorzaakt door **pneumokokken bacteriën**.

Je laten **vaccineren tegen pneumokokken** is belangrijk als je een **groot risico** loopt om **ernstig ziek** te worden door een besmetting met pneumokokken (bijvoorbeeld door een **verminderde weerstand**). De officiële instanties bevelen vaccinatie tegen pneumokokken ook aan bij andere groepen: [alle personen van 65 jaar tot 85 jaar](#), personen vanaf de leeftijd van 50 jaar met onderliggende ziekten (bv. chronische longziekten). Door pneumokokken kan je een ontsteking krijgen van het middenoor, de sinussen of de longen. De bacterie kan ook in de bloedbaan komen en een bloedvergiftiging veroorzaken. Als je al een andere aandoening hebt, zoals bijvoorbeeld langdurig hartlijden, dan kan je sneller en ernstiger ziek worden door een besmetting met pneumokokken.

Na een vaccinatie, maakt je **eigen afweersysteem** een **bescherming** tegen de ziekte. Zo zal je enkele weken na je vaccinatie tegen de pneumokokken, beschermd zijn tegen de types van bacteriën die in het vaccin zitten. Het vaccin beschermt je **niet tegen een longontsteking of een andere ziekte veroorzaakt door andere bacteriën dan pneumokokken**. Ook tegen ziekte door pneumokokken bacteriën is de **bescherming door de vaccinatie nooit volledig**. Het blijft dus erg belangrijk om **algemene hygiënische maatregelen** te nemen:

- was regelmatig je handen met zeep;
- hoest of nies in je elleboog;
- blijf thuis als je je ziek voelt;
- houd afstand van zieke personen.

Het vaccin zelf kan geen besmetting met pneumokokken veroorzaken.

Een pneumokokkenvaccin moet gebruikt worden volgens de **officiële aanbevelingen**. Je kan hierover altijd **advies vragen aan je arts of apotheker**.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmalInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht van de pneumokokkenvaccins vind je de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

Neem de bijsluiter door wanneer je informatie zoekt over een specifiek vaccin (samenstelling, informatie over allergieën ...).



Wat is het vaccinatieschema en wanneer krijg ik dit vaccin?

Wat is het vaccinatieschema?

Een vaccinatie tegen pneumokokken kan worden gegeven aan **volwassenen**, maar ook aan **baby's en kinderen**. Lees hiervoor de fiche '[Vaccin tegen pneumokokken bij kinderen](#)'.

Er bestaan verschillende vaccins tegen pneumokokken:

- **PCV13**: dit vaccin werkt tegen 13 types pneumokokken bacteriën;
- **PCV15**: dit vaccin werkt tegen 15 types pneumokokken bacteriën;
- **PCV20**: dit vaccin werkt tegen 20 types pneumokokken bacteriën;
- **PCV21**: dit vaccin werkt tegen 21 types pneumokokken bacteriën;
- **PPV23**: dit vaccin werkt tegen 23 types pneumokokken bacteriën.

Deze vaccins kunnen gecombineerd worden in een vaccinatieschema om tot de beste bescherming te komen. De keuze voor het vaccin is gebaseerd op de officiële aanbevelingen in België.

Bij volwassenen worden verschillende doelgroepen aanbevolen om zich te laten vaccineren. Welk vaccin je krijgt, hoeveel prikken nodig zijn, en of je herhalingsprikken moet krijgen, is gebaseerd op de officiële adviezen in België. Vraag hierover advies aan je arts.

Wanneer krijg ik dit vaccin?

Bespreek met je arts wanneer je je vaccin(s) best krijgt.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van een pneumokokkenvaccin zijn de volgende:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 mensen)

- lokale reacties op de injectieplaats (roodheid, zwelling, verharding, pijn, gevoeligheid, bewegingsbeperking);
- koorts;
- verminderde eetlust;
- vermoeidheid en hoofdpijn;
- spierpijn en gewrichtspijn.

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- hoge koorts.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- netelroos (urticaria), jeuk of een blauwe plek op de injectieplaats;
- koude rillingen, misselijkheid, duizeligheid;
- overgevoelighedsreacties;
- vergrote lymfeklieren.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen na een pneumokokkenvaccinatie, behalve als je:

- je **duizelig** voelt;
- je **hoofdpijn** hebt.

Deze klachten zullen echter zelden je rijvaardigheid beïnvloeden, maar **blijf altijd voorzichtig**.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken na je vaccinatie.

Er is **geen bekend effect van alcohol** op een pneumokokkenvaccinatie.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten na je vaccinatie.

Er zijn **geen bekende effecten** van bepaalde voedingswaren op het plaatsen van een pneumokokkenvaccinatie.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Je mag je laten vaccineren tegen pneumokokken wanneer je zwanger bent of wanneer je borstvoeding geeft.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Ja, je mag je laten vaccineren tegen pneumokokken tijdens de zwangerschap. Er zijn geen aanwijzingen dat de vaccinatie negatieve effecten heeft op de zwangerschap of op het ongeboren kind.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het plaatsen van een pneumokokkenvaccin met je **arts of apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag je laten vaccineren tegen pneumokokken terwijl je borstvoeding geeft. Er zijn geen

aanwijzingen dat de vaccinatie negatieve effecten heeft op de zuigeling.

Het plaatsen van een pneumokokkenvaccin gebeurt steeds in **overleg met je arts**.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Een pneumokokkenvaccin kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel **gelijktijdig** gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- een **ander vaccin**: vaccins mogen **gelijktijdig** worden toegediend, maar op een verschillende injectieplaats.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Laat je niet vaccineren tegen pneumokokken of overleg met je arts of apotheker in de volgende situaties:

- **ernstige allergische reacties** op een pneumokokken vaccinatie in het verleden;
- als je op het moment van de vaccinatie **ernstig ziek** bent en **hoge koorts** hebt. Stel de vaccinatie uit tot je volledig genezen bent.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van griepvaccinatie, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Bewaar dit geneesmiddel **in de koelkast** (2 – 8°C). Leg het vaccin nooit in de diepvries.

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

