



Belangrijk om te weten

- Als je vakantieplannen hebt met veel **buitenactiviteiten** naar **bosrijke gebieden** in **Oost-, Centraal- en Noord-Europa of naar Azië**, kan het noodzakelijk zijn om je te laten **vaccineren tegen tekenencefalitis**. Bespreek dit met je arts of apotheker.
- Dit vaccin beschermt je **alleen tegen tekenencefalitis**, niet tegen andere infecties die ook worden overgebracht door teken, zoals de ziekte van Lyme.
- Er zijn **officiële aanbevelingen** omtrent vaccinatie tegen tekenencefalitis. Je kan hierover altijd advies vragen aan je arts of apotheker.



Het blijft zeer belangrijk om een **tekenbeet te voorkomen**. Zo kan het virus niet overgedragen worden. Lees het [thema rond teken](#) om meer informatie te krijgen hoe je jezelf en je gezin kan **beschermen** en wat je moet doen als je toch gebeten wordt.

Het **vaccin tegen tekenencefalitis** wordt aangeraden als je **op reis** gaat naar **bepaalde bestemmingen**. Zoek je meer informatie over reisivaccinaties, lees dan [dit thema](#).

Heb je vragen over vaccins? Wil je graag over vaccins praten? Neem een kijkje in [dit thema](#) voor de praatkaarten over vaccinatie.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Een vaccin tegen tekenencefalitis beschermt je tegen deze ziekte. **Tekenencefalitis** is een hersen(vlies)ontsteking die veroorzaakt wordt door het tekenencefalitisvirus, ook wel 'tick-borne encephalitis' virus (TBE) genoemd. **Besmette teken** dragen dit virus over van dier naar dier en soms naar de mens. Als je gebeten wordt door een besmette teek, treedt de infectie direct op. Daarom is het **vermijden van een tekenbeet** zeer belangrijk.

Het wordt aangeraden je te laten vaccineren als je **vakantieplannen** hebt met veel **buitenactiviteiten** naar **bosrijke gebieden** in **Oost-, Centraal- en Noord-Europa of naar Azië**.

In **België** wordt een vaccinatie tegen tekenencefalitis op dit ogenblik **niet aanbevolen**, ook niet voor professionele risicopersonen zoals houthakkers of boswachters, of bij recreatieve risicogroepen zoals wandelaars.

Er zijn dus **officiële aanbevelingen** omtrent vaccinatie tegen tekenencefalitis. Je kan hierover altijd advies vragen aan je arts of apotheker.

Na een vaccinatie, maakt je **eigen afweersysteem** een **bescherming** tegen het virus.

Zoals alle vaccins, kan ook dit vaccin **geen volledige bescherming** bieden aan iedereen die ingeënt is.

Voor een **optimale bescherming**, heb je **drie dosissen** nodig. Je hebt ook **geen levenslange bescherming** waardoor het noodzakelijk kan zijn je opnieuw te laten **vaccineren**.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmalInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

Neem de bijsluiter door wanneer je informatie zoekt over een specifiek vaccin (samenstelling, informatie over allergieën ...).



Wat is het vaccinatieschema en wanneer krijg ik dit vaccin?

Wat is het vaccinatieschema?

De eerste reeks vaccinaties bestaat uit drie dosissen:

1. Je arts beslist wanneer je je eerste dosis krijgt.
2. Je krijgt je tweede dosis één tot drie maanden later.

In geval van een dringende bescherming, is het ook mogelijk om de tweede dosis al twee weken na je eerste dosis te krijgen.

3. Je krijgt je derde dosis vijf tot twaalf maanden na de tweede dosis.

Volwassenen en adolescenten **vanaf de leeftijd van 16 jaar** krijgen het **vaccin voor volwassenen**.

Kinderen van **1 jaar en tot en met 15 jaar** oud krijgen een **junior vaccin** met een **lagere dosis**.

Kinderen **jonger dan 1 jaar** mogen **niet gevaccineerd** worden tegen tekenencefalitis.

Na de eerste reeks vaccinaties houdt de bescherming maximaal drie jaar aan.

Doordat deze vaccinaties **geen levenslange bescherming** bieden, heb je **boostervaccinaties** nodig om beschermd te blijven als een aanhoudende blootstelling of een nieuwe blootstelling van het virus wordt verwacht:

- **Kinderen en adolescenten tot en met 15 jaar:** de eerste boosterdosissen moet drie jaar na de derde dosis gegeven worden. Bijkomende boosterdosissen moeten om de vijf jaar worden gegeven.
- **Adolescenten vanaf 16 jaar oud en volwassenen tot 60 jaar:** je eerste boosterdosissen heb je drie jaar na de derde dosis nodig. Bijkomende boosterdosissen moeten om de vijf à tien jaar worden gegeven.
- **Volwassenen ouder dan 60 jaar:** je hebt een boosterdosissen nodig om de drie jaar.

Indien je de initiële 3 dosissen niet hebt gekregen, dan moet je, ongeacht de termijn die ertussen zit, eerst dit vaccinatieschema afwerken. **Je moet dus altijd eerst de 3 dosissen krijgen**. Daarna kan je een boostervaccin krijgen, zoals hierboven uitgelegd.

Wanneer krijg ik dit vaccin?

Als je op reis gaat naar **bosrijke gebieden** in **Oost-, Centraal- en Noord-Europa of naar Azië** en je hebt veel **buitenactiviteiten** gepland, bespreek dan tijdig met je arts of de vaccinatie tegen tekenencefalitis nodig is. Zorg ervoor dat je minstens twee dosissen hebt gekregen voor vertrek. De beste bescherming heb je uiteraard na de drie dosissen.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van een vaccin tegen tekenencefalitis zijn de volgende:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 mensen)

- pijn en roodheid op de injectieplaats (dit kan enkele dagen aanhouden).

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- hoofdpijn;
- misselijkheid;
- spierpijn;
- gewrichtspijn;
- koorts (bij kinderen);
- gevoel van vermoeidheid, je algemeen niet zo goed voelen.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- opzwellen van je lymfeklieren;
- braken;
- koorts (bij volwassenen);
- kneuzing op de injectieplaats.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen na een vaccinatie tegen tekenencefalitis.

Je kan na de vaccinatie last hebben van **duizeligheid of hoofdpijn**, maar dit zal **zelden je rijvaardigheid beïnvloeden**.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken na je vaccinatie.

Er is **geen bekend effect van alcohol** op een vaccinatie tegen tekenencefalitis.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten na je vaccinatie.

Er zijn **geen bekende effecten** van bepaalde voedingswaren op het plaatsen van een vaccinatie tegen tekenencefalitis.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Je mag je laten vaccineren tegen tekenencefalitis wanneer je zwanger bent of wanneer je borstvoeding geeft.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Ja, je mag je laten vaccineren tegen tekenencefalitis tijdens de zwangerschap. Er zijn geen aanwijzingen dat de vaccinatie negatieve effecten heeft op de zwangerschap of op het ongeboren kind.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Besprek** dan het plaatsen van een vaccin tegen tekenencefalitis met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag je laten vaccineren tegen tekenencefalitis terwijl je borstvoeding geeft. Er zijn geen aanwijzingen dat de vaccinatie negatieve effecten heeft op de zuigeling.

Besprek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en je een vaccinatie tegen tekenencefalitis wil nemen.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Een vaccin tegen tekenencefalitis kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- geneesmiddelen die de **immuniteit onderdrukken**;
- een **ander vaccin**: vaccins mogen gelijktijdig worden toegediend, maar op een verschillende injectieplaats.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Laat je niet vaccineren tegen tekenencefalitis of overleg met je arts of apotheker in de volgende situaties:

- **ernstige allergische reacties** op een vaccinatie tegen tekenencefalitis in het verleden;
- als je op het moment van de vaccinatie **ziek** bent en **koorts** hebt. Stel de vaccinatie uit tot je volledig genezen bent.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van vaccinatie tegen tekenencefalitis, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?

Neem contact op met je arts of apotheker.